

一、单项选择题

1. 影响老年人胃肠道药物吸收的因素是

- A 胃酸增加
- B 胃排空速度加快
- C 肠蠕动减弱
- D 胃肠道血流量加快
- E 运动量增加

2. 影响老年人代谢的因素是

- A 老年人肝脏重量增加
- B 功能性肝细胞减少
- C 肝脏血流量增多
- D 肝脏功能指标异常
- E 肝脏合成蛋白质的能力加强

3. 老年人药效学改变的特点包括

- A 对大多数药物的敏感性降低
- B 对少数药物的敏感性增高
- C 药物耐受性下降
- D 药物不良反应发生率降低
- E 用药依从性加强

4. 老年人常见的用药不良反应是

- A 药物过敏
- B 尿失禁
- C 高血压

D 耳毒性

E 神经症状

5. 老年人用药数量最好控制在 ( ) 以下

A 13 种

B 9 种

C 5 种

D 6 种

E 7 种

6. 老年患者用药的时间, 正确的是

A 地高辛晚 8 ~ 10 点服用

B 阿司匹林每晚睡前服用

C 二甲双胍应在饭前用药

D 铁剂应在晚餐前 0.5h 服用

E 平喘药睡前服用

7. 为老年人做雾化吸入, 为减轻黏膜水肿选择的药物是

A 卡那霉素

B 地塞米松

C 氨茶碱

D 舒喘灵

E  $\alpha$ -糜蛋白酶

8. 使用滴耳剂时, 为使耳道变直, 应轻轻牵拉耳郭的方向是

A 向上方

B 向下方

C 向后上方

D 向前上方

E 以上都不对

9. 老年人口服药物照护措施中正确的是

A 耐心告知老年人服药时间

B 及时准确将药物摆放到位

C 协助老年人将口服药咽下

D 与家属配合提高服药依从性

E 以上都不对

10. 照护人员为老年人滴眼药水，眼药水滴在老年人眼睛的部位是

A 瞳孔部位

B 上眼睑内

C 下结膜内

D 内眼角

E 外眼角

11. 在氧气雾化吸入应用中，氧流量为

A 2~3L/min

B 4~5L/min

C 6~8L/min

D 9~10L/min

E 10~12L/min

12. “三查八对”内容不包括

A 药物的名称

B 药物的剂量

C 药物的方法

D 药物的化学成分

E 药物的浓度

13. 老年高血压患者服用降压药物后，应重点观察

A 精神状态

B 血压值，有无头晕、乏力

C 食欲

D 尿量、排尿次数、尿色

E 血糖值

14. 进行老年人超声波雾化吸入治疗时，操作正确的是

A 水槽内加温水

B 药液直接放入雾化罐内

C 先开电源开关，再开雾化开关

D 停用先关电源开关，再关雾化开关

E 使用后雾化罐不必消毒

15. 协助老年人用药，最重要的一项原则是

A 指导服药

B 注意观察

C 及时发放药物

D 严格遵医嘱给药

E 及时记录

16. 使用超声波雾化吸入器时，操作正确的是

- A 水槽内加入温水
- B 水槽内加入冷蒸馏水
- C 水温超过 70℃应关机
- D 连续使用应间歇 1h
- E 过程中加药时必须关机

17. 易氧化、遇光变质应装入有色密盖瓶中且放于阴凉处保存的药物是

- A 复方新诺明片
- B 氨茶碱片
- C 维生素 E 片
- D 乙肝疫苗
- E 免疫球蛋白

18. 起效最快的给药途径是

- A 皮下注射
- B 吸入给药
- C 口服给药
- D 外敷给药
- E 静脉注射

19. 氧气雾化吸入法操作，正确的是

- A 氧气雾化吸入器与氧气装置连接紧密不漏气
- B 氧气湿化瓶内放冷蒸馏水
- C 调节氧流量 4 ~ 6L / min
- D 口含嘴放入口中，嘱老年患者张嘴呼吸
- E 吸入完毕，先关氧气开关，再关雾化开关

20. 应避免与牙齿接触的药物是

- A 颠茄合剂
- B 1%稀盐酸
- C 维生素 E
- D 磺胺合剂
- E 止咳糖浆

21. 王爷爷, 75 岁, 最近出现心绞痛, 遵医嘱给予硝苯地平治疗, 近 1d 发现用药后心绞痛反而加重, 可能出现的情况是

- A 过敏反应
- B 过激反应
- C 矛盾反应
- D 相容反应
- E 一过性反应

22. 张奶奶, 78 岁, 被诊断为糖尿病, 遵医嘱服用二甲双胍, 但老年人的用药依从性差, 其原因可能是

- A 记忆力较强
- B 经济收入高
- C 担心药物副作用
- D 家庭社会的支持较强
- E 生活条件优越

23. 王奶奶, 72 岁, 照护人员每天早上 9 点上门为她进行 1h 的整体照护, 用药照护中做法不妥的是

- A 清点前一天家中剩余药片数目
- B 将老年人当天需要服用的药物放置在专用的药盒内

C 盒子有 4 个小格，每个小格标明用药的时间

D 将药品放置在阴凉光线较弱的角落

E 为老年人上好闹钟养成按时用药的习惯

24. 刘爷爷，78 岁，心脏病，现病情稳定，但出院后需继续应用洋地黄类药物维持。照护人员对其进行用药指导，告知老年人停止用药的标准是心率低于

A 60 次 / min

B 65 次 / min

C 70 次 / min

D 75 次 / min

E 80 次 / min

25. 李奶奶，76 岁，照护人员帮李奶奶滴眼药水时，操作正确的是

A 协助老年人头稍前倾

B 药液直接滴在角膜上

C 嘱老年人眼向上看

D 角膜有溃疡不应上药

E 右手持眼药水瓶，距眼约 3 ~ 4cm 滴入眼药水

26. 李奶奶，68 岁，需服用止咳糖浆，发药时照护人员的做法正确的是

A 如患者不在可将药物放在床旁桌上

B 发药前测量体温、脉搏

C 将药物发给患者后即可离开

D 指导服药后可以饮茶

E 指导服药后不宜立即饮水

27. 王爷爷，82 岁，近日耳部不适，照护人员给王爷爷使用滴耳液时，操作正确的是

- A 滴耳液的患耳朝下
- B 滴耳液的有效期不重要
- C 滴耳液时可以不用洗净双手
- D 滴耳液使用后需将耳郭向后上方轻轻牵拉
- E 滴药后老年人可立即活动

## 二、共用题干选择题

1. 张阿姨，70岁，因上呼吸道感染，其女儿到附近药店购买了红色标识的抗感冒药物。

(1) 其女儿自行购买的感冒药属于

- A 处方药
- B 甲类非处方药
- C 乙类非处方药
- D 丙类非处方药
- E 乙类处方药

(2) 老年人自行用药前首先要检查药物的

- A 产品名称、适应证
- B 药品成分名称、禁忌证
- C 用法与用量
- D 有效期
- E 生产厂家资质

(3) 在使用抗感冒药过程中正确的是

- A 无论有何反应均应使用一个疗程
- B 治疗一段时间后，如症状未缓解或减轻，应及时去医院诊断治疗
- C 为了更好的治疗效果，首次用药应加量

D 症状缓解后即可停药

E 药物可用酒送服

2. 王先生, 76岁, 有慢性支气管炎病史, 最近咳嗽加剧, 痰黏稠, 伴呼吸困难, 给予超声波雾化吸入治疗。

(1) 超声波雾化吸入治疗的目的不包括

A 帮助祛痰

B 减轻咳嗽

C 释化痰液

D 降低心率

E 消除炎症

(2) 痰液黏稠的首选药物是

A 沙丁胺醇

B 庆大霉素

C 地塞米松

D  $\alpha$ -糜蛋白酶

E 氨茶碱

(3) 超声波雾化吸入后, 需要消毒的物品是

A 水槽

B 透声膜

C 晶体换能器

D 超声波发声器

E 雾化罐