



洗胃溶液的选择

主讲：马丽丽

洗胃法

洗胃法是将大量溶液饮入或通过胃管灌入胃内，以冲洗并清除胃内容物的方法。





■ 适应证

非腐蚀性毒物中毒，如有机磷、安眠药、重金属类与生物碱等及食物中毒。

■ 禁忌证

强腐蚀性毒物（如强酸、强碱）中毒、肝硬化伴食管胃底静脉曲张、胸主动脉瘤、近期内有上消化道出血及胃穿孔患者禁忌洗胃；上消化道溃疡、癌症患者不宜洗胃。

常见的洗胃溶液



中毒药物

灌洗溶液

酸性物

镁乳、蛋清水、牛奶

碱性物

5 %醋酸、白醋、蛋清水、牛奶

氰化物

饮 3 %过氧化氢溶液后引吐，1 : 15000 ~ 1 : 20000 高锰酸钾

敌敌畏

2 % ~ 4 %碳酸氢钠、1 %盐水、
1 : 15000 ~ 1 : 20000 高锰酸钾

1605、1059、4049
(乐果)

2 % ~ 4 %碳酸氢钠

高锰酸钾

敌百虫

1 %盐水或清水、
1 : 15 000 ~ 1 : 20 000 高锰酸钾

碱性药物

DDT、666

温开水或生理盐水洗胃，50 %硫酸镁导泻

油性泻药

巴比妥类 (安眠药)

1 : 15 000 ~ 1 : 20 000 高锰酸钾洗胃、硫酸钠导泻

硫酸镁

灭鼠类 (磷化锌)

硫酸铜洗胃，0 . 5 % ~ 1 %硫酸铜溶液每次 10ml，每 5 ~ 10min 口服一次，并用压舌板刺激舌根催吐

牛奶、鸡蛋、脂肪及其它油类食物

发芽马铃薯

1 : 5000 高锰酸钾或 0 . 5 %鞣酸

毒蕈河豚、生物碱

1 %活性炭悬浮液



洗胃液的禁忌

- 高锰酸钾禁忌有：乐果、05 和 59
- 碱性禁于敌百虫
- 油性泻药禁 DDT , 666
- 巴比妥禁硫酸镁
- 灭鼠药禁蛋、奶、油
- 强酸强碱禁洗胃
- 镁乳、蛋、奶护粘膜