

22 助产选择题练习

1. 急危重症护理学时一门

- A. 综合性应用学科
- B. 跨科学科
- C. 纯理论学科
- D. 应用学科
- E. 实践学科

zj:一、概念(绪论) nd:易 nian:2013 ly: jb: #A

jx:急危重症护理学是一门研究各类急性病、急性创伤、慢性病急性发作及危重患者的抢救与护理的跨学科的综合应用学科。

2. 院前急救包括现场急救和

- A. 现场救护
- B. 急救转运
- C. 途中监护
- D. 灾难救护
- E. 急诊科救护

zj:(一)院前急救 nd:易 nian:2013 ly: jb: #C

jx:院前急救是指急危重症患者进入医院前的救护,包括现场急救和途中监护两大任务。

3. 能使伤病人在最短时间获得救治的保证是

- A. 有装备良好的救护车
- B. 有无线电通讯
- C. ICU
- D. 高素质医护人员
- E. 急救服务体系的有效运行

zj:二、急诊医疗服务体系的管理 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #E

jx:实践证明,急救医疗服务体系的建立与有效运行在抢救患者的生命中发挥着越来越大的作用。

4. EMSS 的第一个环节是

- A. 院前急救
- B. ICU
- C. 专科治疗
- D. 院内急救
- E. 急诊科救护

zj:一、概念(急诊医疗服务体系) nd:较易 nian:2013 ly: jb: #A

jx:院外急救是急救医疗服务体系的首要 and 重要基础。

5. 猝死病人抢救的最佳时间是

- A. 4 分钟
- B. 8 分钟
- C. 10 分钟
- D. 30 分钟
- E. 60 分钟

zj:(二)时间紧迫 nd:易 nian:2013 ly: jb: #A

jx:猝死患者抢救的最佳时间为 4 分钟。

6. 病人在发病或受伤时,最好由谁来进行最初的救护

- A. 第一目击者

- B. 医疗单位赶赴现场
- C. 交通警察
- D. 家属
- E. 红十字卫生员赶赴现场

zj:一、概念(院前急救) nd:易 nian:2013 ly: jb: #A

jx:院前急救是指救护人员和目击者对患者进行必要的急救，但第一目击者可使患者在危急重症发病初期就能得到及时有效的救治，最大限度的缩短“无治疗期”，降低急救患者的死亡率。

7. 下列哪项不是院前急救的特点

- A. 社会性强、随机性大
- B. 时间紧迫
- C. 病种复杂多样
- D. 急救环境条件差
- E. 对因治疗为主

zj:二、院前急救的特点 nd:易 nian:2013 ly: jb: #E

jx:院前急救的特点：社会性强，随机性大、时间紧迫、病种多样复杂、急救环境差、以对症治疗为主、对急救人员要求高。

8. 下列哪项不是院前急救的功能

- A. 维持伤病员的基本生命体征
- B. 减轻痛苦
- C. 稳定伤病情
- D. 安全地分流与转运
- E. 让患者尽快手术

zj:第二章 院前急救 nd:易 nian:2013 ly: jb: #E

jx:院前急救使危重患者在发病初期就给予及时、有效的现场抢救，维持患者生命，防止再损伤，减轻痛苦，并迅速护送患者到医院进行进一步的救治，为院内急救赢得抢救时间和条件，减少患者的死亡率和致残率。

9. 在现场处理成批的伤员时，最安全的体位是

- A. 平卧位头偏向一侧
- B. 头高足低位
- C. 头低足高位
- D. 中凹位
- E. 半坐位

zj:1 协助患者取合适的体位 nd:易 nian:2013 ly: jb: #A

jx:在处理成批伤员时，在不影响急救处理的情况下，应给予病人具有最大安全性的体位，使其平卧位头偏向一侧或屈膝侧卧位，这种体位可以使病人最大限度地放松，且保持呼吸道通畅，可防止误吸的发生。

10. 在院前救护中，下列哪项做法不妥

- A. 急救与呼救并重
- B. 先施救后排险
- C. 先重伤后轻伤
- D. 转送与监护急救相结合
- E. 先复苏后固定

zj:四、院前急救原则 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #B

jx:院前急救原则包括先排险后救护、先复苏后固定、先重伤后轻伤、先止血后包扎、先施救后运送、急救与呼救并重。

11. 以下哪项不是院前急救的措施

- A. 心肺复苏
- B. 气管插管
- C. 骨折复位
- D. 止痛
- E. 搬运

zj:二、急救护理措施 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #C

jx:对骨折、关节严重损伤等患者应在现场紧急固定，以暂时减轻痛苦，减少并发症，有利于患者的转运，固定时，避免盲目复位，以免加重损伤程度。

12. 一急诊创伤患者同时出现下列几种以上的病情，你首先抢救哪一种

- A. 休克
- B. 窒息
- C. 骨折
- D. 内脏脱出
- E. 伤口渗血

zj:(三) 现场救护要点 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #B

jx:在院前急救中应遵循“先救命后治病”的原则，以上几种病情中，窒息会引起机体严重缺氧，器官和组织会因为缺氧而广泛损伤、坏死，尤其是大脑。气道完全阻塞造成不能呼吸只要1分钟，心跳就会停止。所以窒息最为危及患者的生命，需要立即进行抢救。

13. 关于伤员的转送，下列哪项错误

- A. 对昏迷病人，应将头偏向一侧
- B. 生命体征尚不稳定的病人应暂缓汽车长途转送
- C. 途中严密观察病情
- D. 遇有导管脱出应立即插入
- E. 途中不能中断抢救

zj:2 转运中的监测与护理 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #D

jx:转运患者过程中要注意各种管道的护理，必须保持管道通畅，防止坠下、脱出、移位、扭曲等，一旦脱出避免盲目插入，以免造成逆行感染。

14. 关于病人的转运，下列错误的是

- A. 病情不稳定者，应暂缓汽车长途转送
- B. 担架在行进途中，伤员应头部在后，下肢在前
- C. 脊椎受伤者，应保持脊椎轴线稳定
- D. 腹胀者去除胃肠减压术后再空运
- E. 途中要加强生命支持性措施

zj:2 转运中的监测与护理 nd:较难 nian:2013 ly: jb: #D

jx:空运时空气中气压低，腹部外伤有腹胀者应行胃肠减压术后再空运。

15. 导致心脏骤停病因，在心血管疾病中以下哪种占首位

- A. 肥厚型心肌病
- B. 二尖瓣脱垂
- C. 病毒性心肌炎
- D. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
- E. 先天性心脏病

zj:(一) 心源性心搏骤停 nd:易 nian:2013 ly: jb: #D

jx:冠状动脉粥样硬化性心脏病是导致心搏骤停最常见的原因，其中70%死于院外。

16. 心搏骤停最常见的心电图类型为

- A. 心室停止

- B. 电机械分离
- C. 室颤
- D. 完全传导阻滞
- E. 房颤

zj: (一) 心室颤动 nd: 较易 nian: 2013 ly: jb: #C

jx: 心搏骤停可分为三种类型: 心室颤动、心搏骤停和心电-机械分离。其中, 心室颤动是最常见的类型, 约占 2/3。

17. 心跳骤停最早最可靠的临床征象是

- A. 意识突然丧失伴大动脉搏动消失
- B. 瞳孔缩小
- C. 瞳孔散大
- D. 呼吸停止
- E. 心电图显示为室颤

zj: 三、心搏骤停的诊断 nd: 较易 nian: 2013 ly: jb: #A

jx: 意识丧失和大动脉搏动消失是心搏骤停最早且最可靠的临床征象。

18. 判断病人有无脉搏下列哪项是正确的

- A. 同时触摸双侧颈动脉
- B. 颈动脉触摸时, 不要用力过大
- C. 检查时间不得短于 10s
- D. 不能触摸股动脉
- E. 颈动脉搏动点在胸锁乳突肌外缘

zj: 三、心搏骤停的诊断 nd: 较易 nian: 2013 ly: jb: #B

jx: 判断患者有无脉搏可触摸大动脉搏动如颈动脉、股动脉。由于颈动脉位置靠近心脏, 能较准确地反应心跳的情况, 此外颈动脉暴露, 易于迅速判断。方法是用一手置于患者前额使其头部保持后仰同时先用示指和中指确定气管的位置, 然后向外侧移动 2~3cm, 在气管旁软组织处轻轻触摸颈动脉搏动。触摸颈动脉时不能同时触摸两侧颈动脉搏动, 且不能用力过大, 以免压迫颈动脉而影响头部血供。检查脉搏应在 10 秒内完成。

19. 基础生命支持 (BLS) ABC 步骤中的 “B” 是指

- A. 进行人工呼吸
- B. 建立有效循环
- C. 心前区捶击
- D. 畅通呼吸道
- E. 以上均不是

zj: (三) B-重建呼吸 nd: 中 nian: 2013 ly: jb: #A

jx: 基础生命支持 ABC 三步骤中 A (airway) 指开放气道, B (breathing) 指人工呼吸, C (circulation) 指心脏按压。

20. 胸外心脏按压的正确部位

- A. 胸骨中、上 1/3 交界处
- B. 胸骨角
- C. 剑突
- D. 胸骨中、下 1/3 交界处
- E. 心尖处

zj: 1 按压部位 nd: 易 nian: 2013 ly: jb: #D

jx: 胸外心脏按压的部位是胸骨中、下 1/3 交界处。

21. 胸外心脏按压的频率为

- A. 60 次/分
- B. 80 次/分
- C. 100-120 次/分
- D. 130 次/分
- E. 140 次/分

zj:3 按压速率 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #C

jx:《2010 美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》指出胸外心脏按压的频率为至少 100 次/分。

22. 心肺复苏与人工呼吸之比为

- A. 15:2
- B. 30:2
- C. 5:1
- D. 15:4
- E. 5:2

zj:7 按压与呼吸的比例 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #B

jx:《2010 美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》建议在通气之前开始胸外心脏按压。方法是：病人仰卧于硬质平板上，下肢抬高以利于静脉回流。抢救者位于病人一侧，单人施救时，应首先进行 30 次按压开始心肺复苏，而不是进行 2 次通气。按压部位在胸骨下段，双手掌根部相叠，两臂伸直，以上身的重力垂直按压，使胸骨下陷至少 5cm，按压频率至少 100 次/分，保证每次按压后胸廓回弹。

23. 颈部有外伤者必须采用下列哪种手法开放气道

- A. 仰面举颏法
- B. 仰面抬颈法
- C. 双手托下颌法
- D. 仰头抬颈法
- E. 以上都不是

zj:2 托下颌法 nd:中 nian:2013 ly: jb: #C

jx:疑有颈部损伤者常采用双手托下颌法开放气道，以避免脊髓损伤。

24. 患者，女性，65 岁，晨练的路上突然摔倒，意识丧失，大动脉搏动消失。此时恰巧被护士遇到，护士应立即采取的措施是

- A. 立即寻找患者家属
- B. 呼叫 120 来抢救
- C. 先胸外按压，在人工呼吸
- D. 先人工循环，再开放气道、人工呼吸
- E. 先人工呼吸、人工循环，再开放气道

zj:一、基础生命支持 nd:较难 nian:2013 ly: jb: #D

jx: 该患者心搏骤停。《2010 美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》建议在通气之前开始胸外按压。初期复苏（CAB 步骤），即基础生命支持（旧指南为 ABC 步骤）。

25. 判断口对口人工呼吸法是否有效，首先观察

- A. 口唇紫绀是否改善
- B. 瞳孔是否缩小
- C. 吹气时阻力大小
- D. 看到病人胸廓升起
- E. 剑突下隆起

zj:1 口对口呼吸 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #D

jx:口对口人工呼吸方法是一手掌根部按于患者前额并用拇指与示指捏闭患者的鼻孔，另一

手将额部向前抬起。术者吸气，双唇紧贴患者的口部，然后吹起，使胸廓扩张，吹气毕，术者稍抬头部并侧转换气，同时松开捏鼻的手，让患者胸廓依其弹性而回缩。在吹气毕转头侧换气时观察胸廓是否有起伏是判断口对口人工呼吸是否有效的方法。

26. 人工呼吸的吹气频率为

- A. 8~10 次/分
- B. 10~12 次/分
- C. 12~16 次/分
- D. 16~20 次/分
- E. 以上均不是

zj:1 口对口呼吸 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #A

jx:人工呼吸吹气频率成人8~10次/分，8岁以下儿童15次/分，婴幼儿20次/分。

27. 以下哪项是气管内插管术的适应证

- A 喉头水肿，急性喉炎
- B. 主动脉瘤压迫气管者
- C. 颈椎骨折脱位
- D. 呼吸，心跳骤停
- E. 出血体质或有出血倾向者

zj:二、适应证（气管插管术） nd:易 nian:2013 ly: jb: #D

jx:气管插管适应证有上气道梗阻需要立即建立可控制的人工气道者和各种原因造成的下呼吸道分泌物潴留需要引流者、喉痉挛、各种原因引起的呼吸衰竭、各种全麻或静脉复合麻醉者。

28. 气管插管时间不宜超过

- A. 6h
- B. 12h
- C. 24h
- D. 36h
- E. 72h

zj:六、术后护理（气管插管术） nd:易 nian:2013 ly: jb: #E

jx:气管插管患者超过72h病情仍不见改善者，应考虑行气管切开术。

29. 气管切开时，切口不能低于

- A. 第二气管环
- B. 第三气管环
- C. 第四气管环
- D. 第五气管环
- E. 第六气管环

zj:3 切开气管 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #D

jx:切开气管时切开第3~4或4~5气管软骨环。

30. 气管内插管气囊压力过高、充气时间过长，可能易导致

- A. 气管插管滑脱
- B. 气道漏气
- C. 气道黏膜溃疡坏死
- D. 气道阻塞
- E. 咳嗽反射

31. 气管切开的病人，拔管的指征是全堵多少小时后，病人呼吸平稳，发音正常即可拔管

- A. 4~6 小时

- B. 6~8 小时
- C. 10~12 小时
- D. 12~24 小时
- E. 24~48 小时

zj: (八) 拔管护理 (气管切开术) nd: 较易 nian: 2013 ly: jb: #E

jx: 堵管 24~48 小时后患者活动、睡眠均无呼吸困难, 即可拔管。

32. 包扎止血法不适用于

- A. 小动脉出血
- B. 中静脉出血
- C. 小静脉出血
- D. 大动脉出血
- E. 毛细血管出血

zj: (一) 加压包扎止血法 nd: 较易 nian: 2013 ly: jb: #D

jx: 加压包扎止血法适用于较小的静脉出血或毛细血管出血。

33. 前臂出血时, 上止血带的部位应为

- A. 前臂上 1/3 处
- B. 上臂上 2/3 处
- C. 上臂上 1/3 处
- D. 上臂下 1/3 处
- E. 肘窝

zj: 五、护理要点 (止血带止血法) nd: 较易 nian: 2013 ly: jb: #C

jx: 前臂出血时, 上止血带的部位应为上臂上 1/3 处, 不可在上臂中、下交界处附近, 以防损伤挠动脉。

34. 前臂动脉损伤出血应压迫

- A. 肱动脉
- B. 锁骨下动脉
- C. 颈动脉
- D. 枕动脉
- E. 面动脉

zj: 6 前臂出血 nd: 较易 nian: 2013 ly: jb: #A

jx: 前臂出血压迫肱动脉止血。

35. 止血带结扎止血时应隔多长时间放松一次

- A. 15min
- B. 1h
- C. 2h
- D. 3h
- E. 4h

zj: 五、护理要点 (止血带止血法) nd: 易 nian: 2013 ly: jb: #B

jx: 使用止血带的时间不宜超过 3 小时, 并每隔 1 小时放松 1 次。

36. 有关包扎的叙述, 错误的是

- A. 包扎动作要轻柔, 不要触及伤口
- B. 包扎松紧要适宜
- C. 包扎时要保持伤员体位舒适
- D. 包扎方向由近心端向远心端, 注意露出肢体末端
- E. 包扎时应在肢体的外侧面打结, 不要打在伤口上

zj:五、护理要点（包扎法） nd:较易 nian:2013 ly: jb: #D
jx:包扎时应由肢体远端到肢体近端。

37. 绷带包扎顺序原则上应为

- A. 从上向下、从左向右、从远心端向近心端
- B. 从下向上、从右向左、从远心端向近心端
- C. 从下向上、从左向右、从远心端向近心端
- D. 从下向上、从左向右、从近心端向远心端
- E. 从上向下、从右向左、从近心端向远心端

zj:五、护理要点（包扎法） nd:较易 nian:2013 ly: jb: #C
jx:绷带包扎顺序原则上应为从下向上、从左向右、从远心端向近心端。

38. 前臂损伤可选用下列哪种方法包扎固定

- A. 环形包扎法
- B. 螺旋型包扎法
- C. 螺旋反折形包扎法
- D. “8”字形包扎法
- E. 回返包扎法

zj:4 螺旋反折法 nd:中 nian:2013 ly: jb: #C
jx:螺旋反折包扎法适用于上下周径明显不等的肢体部位，如前臂和小腿等处。

39. 患儿，女，8岁，近几天因排练少儿节目，用嗓过度，在坐公共汽车回家途中突然出现呼吸困难、面色青紫、窒息，现场应采取何种急救措施

- A. 环甲膜穿刺
- B. 气管插管
- C. 气管造口
- D. 气管切开
- E. 人工呼吸

zj:二、适应证（环甲膜穿刺术） nd:中 nian:2013 ly: jb: #A
jx:患儿可能发生了喉部水肿引起的呼吸道梗阻，从而导致窒息，窒息会很快造成机体严重缺氧，病情危急，在现场要迅速进行环甲膜穿刺，来暂时改善缺氧症状，为下一步的治疗争取时间。

40. 中暑的最主要的原因是

- A. 环境高热
- B. 环境高湿度
- C. 病人个人情况
- D. 服用了阿托品
- E. 饮水过少

zj:第一节 中暑患者的护理 nd:易 nian:2013 ly: jb: #A
jx:对高温环境的适应能力不足是致病的主要原因。

41. 不属中暑先兆的临床表现是

- A. 大量出汗
- B. 头晕头痛
- C. 脉搏细速
- D. 口渴胸闷
- E. 四肢无力

zj:1 先兆中暑 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #C
jx:脉搏细弱是重度中暑中暑衰竭的临床表现。

42. 热痉挛的发病机制是

- A. 缺钙
- B. 周围血管扩张，循环血量不足
- C. 体内热量蓄积，体温升高
- D. 大量出汗使水、盐丢失
- E. 散热障碍

zj: (2) 中暑痉挛 nd:中 nian:2013 ly: jb: #D

jx:热痉挛是由于在强体力劳动大量出汗，饮水量大而未补充钠盐时，因体液被稀释，使血浆中钠和氯浓度降低而引起短暂、间歇的肌肉痉挛。

43. 热射病的特征是

- A. 肌肉痉挛
- B. 乏力、眩晕、多汗
- C. 周围循环衰竭
- D. 高热、无汗、昏迷
- E. 嗜睡、抽搐、呼吸快而浅

zj: (1) 中暑高热 nd:中 nian:2013 ly: jb: #D

jx:热射病三联征为高热、无汗、意识障碍。

44. 热射病的急救首先应

- A. 吸氧
- B. 降温
- C. 防治脑水肿
- D. 纠正水、电解质紊乱
- E. 迅速转运病人到医院

zj: (1) 中暑高热 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #B

jx:迅速降温是抢救重度中暑的关键。

45. 热痉挛病人的突出表现是

- A. 四肢肌无力
- B. 呼吸机痉挛、呼吸麻痹
- C. 腓肠肌痉挛、疼痛
- D. 胸大肌痉挛、胸痛
- E. 肠道平滑肌痉挛、疼痛

zj: (2) 中暑痉挛 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #C

jx:中暑痉挛的特点为四肢无力、肌肉痛性痉挛、疼痛。以小腿腓肠肌的痉挛性疼痛最常见。

46. 某溺水者，心跳、呼吸停止已超过6分钟，现场处理应首先

- A. 应用强心剂
- B. 应用呼吸兴奋剂
- C. 患者已死亡不需要抢救
- D. 清除口鼻腔及气管内集水
- E. 人工呼吸和心脏按压

zj:2 保持呼吸道通畅 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #D

jx:对于溺水的患者应立即恢复有效通气，保持气道通畅是前提。

47. 关于淡水淹溺的病理生理变化，下列哪项是不正确的

- A. 血容量增加
- B. 低钾血症
- C. 高钾血症

D. 低氯血症

E. 低蛋白血症

zj:2 淡水淹溺 nd:中 nian:2013 ly: jb: #B

jx:淡水淹溺重者发生溶血，造成高钾血症。

48. 高压触电死亡的最常见原因是

A. 呼吸中枢抑制

B. 烧伤

C. 急性肺水肿

D. 心率失常

E. 心室颤动

zj:第三节 触电患者的护理 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #A

jx:高压触电死亡的主要原因是高压电流对延髓呼吸中枢的损害，引起呼吸中枢抑制、麻痹，导致呼吸中枢停止。

49. 抢救触电病人应采取的第一步措施是

A. 立即切断电源

B. 处理电灼伤

C. 吸氧

D. 人工呼吸

E. 心肺复苏

zj:1 迅速脱离电源 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #A

jx:对于触电患者现场急救应先采取最安全、最迅速的办法，使触电者脱离电源。

50. 对前来急诊的患者，护士应首先进行

A. 卫生指导

B. 健康教育

C. 预检分诊

D. 心理安慰

E. 查阅安慰

zj:一、接诊 nd:易 nian:2013 ly: jb: #C

jx:当急诊患者到达急诊室，护士应立即查看病情，及时、果断地进行分诊，安排到相应的诊室进行就诊。

51. 李某，冠心病史3年，今晨于公交车上突然出现四肢抽搐，两眼上翻，呼吸心跳减弱，司机与乘客立即送到急诊室，分诊护士处理正确的是

A. 分诊护士立即协助医生进行心肺复苏

B. 分诊护士立即开通绿色通道，医护人员进行抢救

C. 分诊护士立即进行心肺复苏

D. 分诊护士立即协同其他护士进行心肺复苏

E. 分诊护士立即呼叫医生进行抢救

zj:(一) 急救绿色通道服务人群 nd:中 nian:2013 ly: jb: #B

jx:该患者既往有冠心病史，发病时生命体征不稳定，对于生命体征不稳定和预见可能出现危及生命的各类急重症患者均应纳入急救绿色通道。

52. 某患者，因车祸而造成右下肢开放性骨折，大量出血，被送至急诊科，在医师未到之前，值班护士首先应立即

A. 详细询问发生车祸的原因

B. 向保卫部门报告

C. 给患者注射镇静剂、止血剂

D. 劝患者耐心等待医师

E. 给患者止血、测血压、配血、建立静脉输液通道

zj:三、急诊护理 nd:中 nian:2013 ly: jb: #E

jx:对于危重患者，应立即通知专科医师进行紧急处理，在医师到来之前，立即实施抢救流程中的护理常规，同时密切观察患者病情变化。

53. 毒物的主要排泄途径为

A. 肝

B. 肾

C. 肠

D. 胆道

E. 呼吸道

zj:3 毒物的排泄 nd:易 nian:2013 ly: jb: #B

jx:毒物代谢后大部分由肾脏和肠道排出，肾脏排出更快。

54. 对于急性中毒病人，首要的急救原则是

A. 清除进入体内尚未吸收的毒物

B. 终止接触毒物

C. 对症处理

D. 使用特效解毒药

E. 清除体内已被吸收的毒物

zj:（一）立即终止接触毒物，清除尚未吸收的毒物 nd:较易 nian:2013

ly: jb: #B

jx:对于急性中毒患者应立即终止接触毒物。

55. 下列哪项口服中毒忌作常规洗胃

A. 重金属

B. 强酸、强碱

C. 有机磷农药

D. 生物碱

E. 安眠药

zj:3 食入性中毒的急救 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #B

jx:强酸、强碱具有强烈的刺激和腐蚀作用，口服中毒者禁忌洗胃，否则容易造成胃肠穿孔。

56. 口服毒物一般在几小时内洗胃最有效

A. 2h

B. 6h

C. 8h

D. 10h

E. 12h

zj:3 食入性中毒的急救 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #B

jx:口服毒物后 6h 内洗胃最有效。

57. 下列中毒皮肤粘膜呈樱红色的是

A. 亚硝基类中毒

B. 一氧化碳中毒

C. 四氯化碳中毒

D. 毒蕈中毒

E. 有机磷中毒

zj:2 中度中毒（CO） nd:较易 nian:2013 ly: jb: #B

jx:一氧化碳中毒皮肤黏膜呈樱桃红色。

58. 诊断有机磷杀虫药中毒的特异性指标是

- A. 头部 CT
- B. 血 COHb 的测定
- C. 动脉血气分析
- D. 全血胆碱酯酶活力测定
- E. 心电图

zj:1 全血胆碱酯酶 (CHE) 测定 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #C

jx:全血胆碱酯酶 (CHE) 测定是诊断有机磷中毒的特异性试验指标, 对中毒程度、疗效判断和预后估计均极为重要。

59. 有机磷中毒机制是

- A. 直接抑制呼吸中枢
- B. 使胆碱酯酶活性增加
- C. 使乙酰胆碱在体内蓄积
- D. 间接抑制血红素合成酶
- E. 抑制延脑中枢引起呼吸、循环衰竭

zj:一、有机磷农药的中毒机制 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #C

jx:有机磷农药中毒的机制主要是抑制体内胆碱酯酶的活性, 导致乙酰胆碱在体内积聚。

60. 一女性患者, 28 岁, 意识丧失昏迷, 呼出气有大蒜味, 双瞳孔针尖大小, 首先想到的是

- A. 脑出血
- B. 有机磷中毒
- C. 阿托品中毒
- D. 视神经萎缩
- E. 糖尿病酸中毒

zj:1 毒蕈碱样症状 nd:中 nian:2013 ly: jb: #B

jx:有机磷中毒患者由于平滑肌痉挛, 瞳孔缩小如针尖样大小, 中枢神经系统受乙酰胆碱刺激后有头晕、头痛、抽搐和昏迷等表现。且有机磷农药有蒜臭味。

61. 阿托品化的临床表现是

- A. 面色苍白
- B. 心率减慢
- C. 瞳孔缩小
- D. 肺内湿罗音消失
- E. 瞻望

zj:1 应用阿托品的观察与护理 nd:中 nian:2013 ly: jb: #D

jx:阿托品化表现为: 瞳孔较前扩大不再缩小、心率增快 ≤ 120 次/分、颜面潮红、口干、皮肤黏膜干燥、肺内湿性啰音消失。

62. 以下哪项属于有机磷杀虫药中毒的烟碱样症状

- A. 多汗、流涎
- B. 尿失禁
- C. 头晕、头痛
- D. 肌肉颤动
- E. 肺水肿

zj:2 烟碱样症状 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #D

jx:烟碱样症状是由乙酰胆碱在横纹肌神经-肌肉接头处过度蓄积和刺激, 使面、眼睑、舌、四肢和全身横纹肌发生肌纤维颤动。

63. 下列哪项不是阿托品化的指标

- A. 瞳孔扩大不再缩小
- B. 皮肤干燥
- C. 脸色潮红
- D. 心率加快 150 次/分
- E. 体温正常或轻度升高

zj:1 应用阿托品的观察与护理 nd:中 nian:2013 ly: jb: #D

jx:阿托品化表现为：瞳孔较前扩大不再缩小、心率增快 ≤ 120 次/分、颜面潮红、口干、皮肤黏膜干燥、肺内湿性啰音消失。

64. 下列哪项不是“阿托品化”的指标

- A. 颜面潮红、干燥
- B. 体温正常或轻度升高
- C. 心率增快 ≤ 120 次/分
- D. 瞳孔散大
- E. 意识清楚或模糊

zj:1 应用阿托品的观察与护理 nd:中 nian:2013 ly: jb: #D

jx:阿托品化表现为：瞳孔较前扩大不再缩小、心率增快 ≤ 120 次/分、颜面潮红、口干、皮肤黏膜干燥、肺内湿性啰音消失。

65. 急性 CO 中毒最有价值的诊断指标是

- A. 血 COHb 浓度
- B. 血气分析
- C. 脑电图
- D. 血电解质
- E. 脑 CT

zj:1 血液 COHb 测定 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #A

jx:一氧化碳经呼吸道进入血液，与红细胞内血红蛋白结合形成稳定的碳氧血红蛋白（COHb）。由于 CO 与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力大 240 倍，而碳氧血红蛋白的解离较氧合血红蛋白的解离速度慢 3600 倍，故易造成碳氧血红蛋白在体内的蓄积。

66. 急性一氧化碳中毒时首要的治疗方法是

- A. 氧气疗法
- B. 使用 ATP
- C. 冬眠疗法
- D. 血压透析
- E. 应用甘露醇

zj: (二) 氧气吸入的护理 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #A

jx:氧疗是 CO 中毒最有效的治疗方法。

67. 某女，32 岁，被人发现昏倒在地，呼吸微弱，室内可闻及煤气味，发现者立即就地做人工呼吸，开窗、呼救，其急救措施中错误的是

- A. 未及时供氧
- B. 未及时用呼吸兴奋剂
- C. 未及时输液
- D. 未清理呼吸道
- E. 未及时撤离现场

zj: (一) 现场急救 (C0) nd:中 nian:2013 ly: jb: #E

jx:对于 C0 中毒患者现场抢救应先迅速脱离中毒环境, 将患者移至空气清新的地方抢救。

68. 某男, 42 岁, 服敌百虫 1h 入院。昏迷, 双瞳孔缩小, 皮肤湿冷, 心率 84 次/分, 律齐。

以下哪项急救措施是不正确的

- A. 静脉注射阿托品
- B. 静脉滴注解磷定
- C. 硫酸镁导泻
- D. 给氧
- E. 1%~2%碳酸氢钠洗胃

zj:四、护理措施 (有机磷农药中毒) nd:较难 nian:2013 ly: jb: #E

jx:敌百虫中毒禁用 2%碳酸氢钠洗胃, 因碱性溶液可使其转化为毒性更强的敌敌畏。

题型 (39~40 题共用题干)

王某, 男, 42 岁, 因酗酒突发急性胰腺炎, 送院急诊室。查体: 神清, 反应迟钝, 屈膝卧位, 呼吸 26 次/min, 血压 80/45mmHg, 脉搏 52 次/min。

69、在抢救过程中护士不正确的是

- A. 及时作好记录
- B. 护士向医生重复背述口头医嘱
- C. 医护双方核对后用药
- D. 快速急救, 不必双方核对医嘱
- E. 超常规用药应双方核对后用药

70、抢救没开书面医嘱或没记录处理正确的是

- A. 抢救后不用补记
- B. 及时补上准确记录
- C. 抢救记录应简单
- D. 不能后补医嘱, 只记护理记录即可
- E. 护理记录因急救不用规范书写

71. 下列哪项不是先兆中暑的临床表现

- A. 大汗
- B. 恶心
- C. 口渴
- D. 四肢痉挛
- E. 注意力不集中

zj:1 先兆中暑 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #D

jx:四肢痉挛是重度中暑中中暑痉挛的临床表现。

72. 热衰竭的发生机制是

- A. 体温调节功能障碍
- B. 大量出汗未及时补充水分
- C. 散热不足致体内热蓄积
- D. 高温对中枢神经系统的抑制作用
- E. 大量出汗后饮水过多而盐补充不足

zj: (3) 中暑衰竭 nd:中 nian:2013 ly: jb: #B

jx:热衰竭主要因为出汗过多, 未及时补充水分, 导致失水、失钠, 血液浓缩, 或饮水中又缺盐, 而形成低渗性脱水。继而出现皮肤血管扩张, 血管舒缩功能失调, 导致周围循环衰竭。

73. 中暑时最易发生痛性痉挛的肌肉是

- A. 腹直肌
- B. 胸大肌
- C. 肠平滑肌
- D. 腓肠肌
- E. 肱二头肌

zj: (2) 中暑痉挛 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #D

jx:中暑痉挛以小腿腓肠肌的痉挛性疼痛最常见。

74. 某农民在夏收劳动中突然头晕、耳鸣、口渴、恶心、四肢乏力、体温 37.5℃，首要的处理是

- A. 头部、腋下放冰袋
- B. 移至阴凉通风处休息
- C. 给予氧气吸入
- D. 静脉滴注生理盐水
- E. 静脉滴注 5%葡萄糖液

zj:1 迅速将患者搬离高热环境 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #B

jx:对于先兆中暑和轻度中暑的患者应先迅速将患者搬离高热环境，安置到通风良好的阴凉处。

75. 口服毒物不明时可选用的洗胃液是

- A. 2%碳酸氢钠
- B. 生理盐水
- C. 蛋清
- D. 1:5000 高锰酸钾
- E. 0.3% H_2O_2

zj:3 食入性中毒的急救 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #B

jx:紧急情况下或毒物不明时，通常用清水或生理盐水洗胃。

76. 有机磷杀虫药中毒的毒蕈碱样症状主要是指

- A. 腺体分泌亢进，运动神经兴奋
- B. 腺体分泌亢进，平滑肌痉挛
- C. 腺体分泌减退，平滑肌松弛
- D. 腺体分泌减退，平滑肌痉挛
- E. 运动神经兴奋，平滑肌痉挛

zj:1 毒蕈碱样症状 nd:中 nian:2013 ly: jb: #B

jx:有机磷农药中毒时，毒蕈碱样症状主要是由于副交感神经兴奋所致，表现为平滑肌痉挛和腺体分泌增加。

77. 有机磷农药中毒，下列哪一项症状属于烟碱样症状

- A. 瞳孔缩小
- B. 流涎
- C. 牙关紧闭
- D. 大汗
- E. 腹泻

zj:2 烟碱样症状 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #C

jx:烟碱样症状常表现为颤动、牙关紧闭、抽搐、全身紧束压迫感，而后发生肌力减退和瘫痪，呼吸肌麻痹而引起周围性呼吸衰竭。其他选项为毒蕈碱样症状。

78. 有机磷农药中毒，下列哪一项症状属于毒蕈碱样症状的是

- A. 瞳孔缩小
- B. 抽搐

- C. 牙关紧闭
- D. 全身紧束感
- E. 颤动

zj:1 毒蕈碱样症状 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #A

jx:有机磷农药中毒时副交感神经兴奋，引起平滑肌痉挛而致瞳孔缩小，严重者瞳孔小如针尖。其他选项为烟碱样症状。

79. 皮肤接触腐蚀性毒物时，体表冲洗的时间应达到

- A. 5-10 分钟
- B. 10-15 分钟
- C. 15-30 分钟
- D. 30 分钟
- E. 30 分钟以上

zj:2 接触性中毒的急救 nd:较易 nian:2013 ly: jb: #C

jx:皮肤接触腐蚀性毒物时，冲洗时间应达到 15~30 分钟。

80. 一氧化碳中毒病人皮肤粘膜的典型表现为

- A. 面色潮红、口唇樱桃红色
- B. 面色发紫、口唇樱桃红色
- C. 面色灰暗，口唇发紫
- D. 面色潮红、口唇发紫
- E. 皮肤粘膜无任何变化

zj:2 中度中毒 (CO) nd:较易 nian:2013 ly: jb: #A

jx:CO 中毒皮肤黏膜呈樱桃红色，面色潮红。