

产时会阴消毒技术操作流程

目的：

为阴道操作、自然分娩、妇产科手术做准备

评估：

- 1、核对患者姓名、床号，告知患者会阴消毒的目的
- 2、检查会阴清洁度及外阴皮肤情况，做好操作前的解释工作
- 3、如为孕妇，了解孕周及产程开始情况，阴道流血，流液情况

准备：

- 1、护士准备：衣帽整洁、洗手、戴口罩
- 2、用物准备：冲洗盘内放：1000ml量杯2个（内盛39~40℃的温开水）、无菌镊子4把、无菌敷料罐2个（以个内盛10%~20%肥皂水纱布，另一个内盛碘伏原液纱布），无菌接生巾、垫巾、污水桶

操作：

- 1、核对患者，帮助患者取合适卧位（外展屈膝位或膀胱截石位），充分暴露会阴部，臀下铺垫巾
 - 2、将产床调节呈床尾向下倾斜的位置，并将产妇腰下的衣服向上拉，以免冲洗时浸湿
 - 3、用镊子取肥皂水纱布1块，先擦洗阴阜、左右腹股沟、左右大腿内侧上1/3处，再擦洗会阴体、两侧臀部，擦洗时稍用力，然后丢弃纱布。
 - 4、再取肥皂水纱布1块，按顺序擦洗尿道口→阴道口→大阴唇→会阴体，稍用力，最后擦肛门，丢弃纱布及镊子
 - 5、用温水有外之内缓慢冲洗皂迹（冲洗前，操作者可将水倒再手腕部测温，待温度合适后，再给产妇冲洗。）冲洗过程及时沟通，询问患者水温是否适宜，室内温度是否合适，并做适当调节，防止产妇受凉，操作者轻柔规范，观察产妇的反应，及时判断产程进展。
 - 6、再按3、4、5程序重复一遍
 - 7、夹取碘伏原液纱布1块，消毒外阴1遍，擦洗顺序为尿道口→阴道口→小阴唇→大阴唇→阴阜，换第2块碘伏原液纱布擦洗腹股沟→大腿内侧上1/3处→会阴体→肛门，不要超出温水冲洗清洁范围，弃镊。根据需要进行第二遍消毒：更换持物镊，同法擦洗，步骤同上
 - 8、消毒后根据需要以生理盐水冲洗会阴，撤出臀下垫巾，垫好无菌接生巾
- 整体要求：
- 1、消毒原则：有内向外，自上而下
 - 2、操作过程中注意遮挡患者，给予保暖，避免受凉。
 - 3、进行第二遍外阴消毒时，消毒范围不能超过第一遍范围
 - 4、操作中注意无菌原则