

泌尿系统损伤病人的护理

1.患者，男性，20岁，从3米高处跌下，骑跨于木杆上。经检查阴茎、会阴和腹壁青紫肿胀，排尿困难，尿道口滴血，应考虑为

- A. 会阴部挫伤
- B. 下腹部挫伤
- C. 前尿道损伤
- D. 后尿道损伤
- E. 膀胱损伤

解析：尿道损伤多见于青壮年男性，好发于前尿道球部和后尿道膜部，球部损伤多见于骑跨伤，膜部损伤多见于骨盆挤压伤，前尿道损伤出现初期血尿，后尿道损伤则为终末血尿。前尿道损伤时阴茎、阴囊、会阴和下腹壁出现尿外渗，表现为会阴、阴囊处肿胀、青紫或瘀斑。后尿道损伤时耻骨后间隙及膀胱颈周围出现尿外渗，若尿生殖膈撕裂，会蔓延到会阴和阴囊。

2.可采取非手术治疗的肾损伤类型是

- A. 肾挫伤
- B. 肾全层裂伤
- C. 肾蒂血管裂伤
- D. 严重肾部分裂伤
- E. 肾损伤并有输尿管损伤

解析：肾挫伤病情较轻，经非手术疗法多可治愈。

3.男性最常见的泌尿系损伤部位是

- A. 肾
- B. 输尿管
- C. 膀胱
- D. 前尿道
- E. 后尿道

解析：男性最常见的泌尿系损伤部位是前尿道，常见的致伤原因是骑跨伤。

4.肾损伤非手术治疗，至少应卧床休息

- A. 1周
- B. 2周
- C. 3周
- D. 4周
- E. 5周

解析：绝对卧床休息是肾损伤非手术疗法中最重要的措施，可减少再出血发生。一般卧床2~4周，直至血尿消失后1周才能下床活动，过早离床活动可能诱发或加重出血。

5.患者右腰部被重物击伤，自觉疼痛，查体见右腰部压痛、叩击痛，血压、脉搏正常，尿液镜检红细胞10~15个/高倍视野，应考虑

- A. 腰部挫伤
- B. 肾挫伤
- C. 肾部分裂伤
- D. 肾全层裂伤
- E. 肾蒂裂伤

解析：C

6. 肾损伤最常见的症状是

- A. 疼痛
- B. 肿块
- C. 血尿
- D. 休克
- E. 感染

解析：C

7. 男性患者，25岁，下腹部被踢伤，伤前膀胱内憋尿，现下腹部疼痛，排尿障碍，可能损伤的为

- A. 肾损伤
- B. 输尿管损伤
- C. 尿道损伤
- D. 腹膜外型膀胱破裂
- E. 腹膜内型膀胱破裂

解析：E

8. 男性泌尿系损伤中最常见的部位是

- A. 肾
- B. 输尿管
- C. 膀胱
- D. 尿道
- E. 前列腺

解析：D

9. 肾损伤病人须卧床至

- A. 休克纠正后
- B. 血尿转清后
- C. 腰部肿块不再增大
- D. 2周左右
- E. 镜下血尿消失1周

解析：E

10. 骑跨伤造成尿道损伤的部位是

- A. 尿道海绵体部
- B. 尿道球部
- C. 尿道膜部
- D. 尿道前列腺部
- E. 阴茎部

解析：B

11. 腹部外伤患者有严重血尿及腰痛，检查患侧腰部扪及一压痛性包块，应估计为哪种损伤

- A. 肾挫伤
- B. 肾部分裂伤
- C. 肾全层裂伤

- D. 肾蒂损伤
- E. 输尿管损伤

解析：C

12. 肾损伤的主要临床表现不包括

- A. 腰部疼痛
- B. 膀胱刺激征
- C. 发热
- D. 休克
- E. 腰腹部肿块

解析：B

13. 肾全部切除术后应卧床

- A. 1 周
- B. 2—3 天
- C. 2 周
- D. 2—4 周
- E. 4—6 周

解析：B

14. 膀胱损伤的主要表现错误的是

- A. 休克
- B. 排尿困难
- C. 尿瘘
- D. 肾区疼
- E. 血尿

解析：D

15. 肾挫伤的主要临床表现为

- A. 大量肉眼血尿
- B. 显微镜下血尿
- C. 不易纠正的严重休克
- D. 腰部肿块和肉眼血尿
- E. 腰部肿块

解析：B

16. 肾全层裂伤的主要临床表现为

- A. 显微镜下血尿
- B. 肉眼血尿
- C. 腰部肿胀和尿外渗
- D. 不易纠正的严重休克
- E. 肉眼血尿和腰部尿外渗

解析：E

17. 肾蒂血管破裂最主要的临床表现为

- A. 显微镜下血尿
- B. 大量肉眼血尿
- C. 腰部肿块
- D. 腹膜炎症状
- E. 不易纠正的严重休克

解析：E

18. 哪种类型的肾损伤对病人危害最大

- A. 肾挫伤
- B. 肾部分裂伤
- C. 肾全层裂伤
- D. 肾盂，输尿管裂伤
- E. 肾蒂血管裂伤

解析：E

19. 肾挫伤的保守护理措施重点为

- A. 每小时留一次尿做比色观察
- B. 观察腹部肿胀程度
- C. 观察皮肤受压情况
- D. 绝对卧床 2 周
- E. 每日测体温 1 次

解析：D

20. 下腹部被踢伤后，有下腹部疼痛和排尿痛，无排尿障碍，查体：下腹部有压痛，无肌紧张，尿中红细胞满视野，考虑为

- A. 尿道损伤
- B. 膀胱挫伤
- C. 腹膜内膀胱破裂
- D. 腹膜外膀胱破裂
- E. 下腹壁软组织挫伤

解析：B

21. 病人女性，35 岁，因左腰部外伤 2h 入院，尿检 RBC，首先考虑为

- A. 脾破裂
- B. 输尿管损伤
- C. 膀胱破裂
- D. 左肾外伤
- E. 尿道外伤

解析：D

22. 女性，45 岁，因下腹部外伤 12h 入院。全腹紧张、压痛、腹腔穿刺抽出淡红色液体，伤后 12h 无排尿，首先考虑为

- A. 肾破裂
- B. 输尿管损伤
- C. 膀胱破裂

D.尿道损伤

E.脾破裂

解析：C

23. 车祸致下腹部损伤和骨盆骨折，病人出现以下症状，其中可区别尿道损伤与膀胱损伤的是

A. 休克

B. 排尿困难

C. 尿潴留

D. 血尿

E. 尿外渗

解析：一般尿道损伤病人常可出现疼痛，尿外伸，血尿与尿潴留，严重创伤可致大出血休克，而膀胱损伤常见的为膀胱破裂，一般无尿潴留。C

24. 判断膀胱破裂最简便的检查方法是

A. 耻骨上膀胱穿刺

B. 插入尿管

C. 膀胱造影

D. 导尿及膀胱注水试验

E. 腹腔穿刺

解析：膀胱测漏试验：膀胱破裂时，导尿管虽可顺利插入膀胱，但仅引出少量血尿。经导尿管注入生理盐水 200ml，稍待片刻回抽，若抽出液体量明显少于 200ml，提示膀胱破裂。D