急性血源性化脓性骨髓炎病人的护理

1.急性血源性骨髓炎好发的部位是

- A. 长骨的骨干
- B. 长骨的干骺端
- C. 扁骨
- D. 骨髓
- E. 短骨

解析：急性骨髓炎好发部位是：股骨、胫骨和肱骨的干骺端。

2.关于急性骨髓炎，以下哪项不正确

- A. 常见于10岁以下儿童
- B. 多发生于长骨干骺端
- C. 有寒战、高热
- D. 患肢持续疼痛
- E. 检查无压痛

解析：急性骨髓炎应避免检查压痛，以免引起病人疼痛。

3.化脓性骨髓炎最常见的感染途径是

- A. 血液循环播散
- B. 手术后感染
- C. 邻近软组织感染扩散
- D. 开放性骨折
- E. 骨关节结核

解析：A

4.急性血源性骨髓炎的主要致病菌是

- A. 白色葡萄球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 绿脓杆菌
- D. 大肠杆菌
- E. 有芽孢的厌氧菌

21.3.1.2 致病菌

解析：B

5.骨髓炎及骨肉瘤的病人发生骨折时属于

- A. 病理性骨折
- B. 疲劳性骨折
- C. 裂缝骨折
- D. 青枝骨折
- E. 嵌插骨折

解析:A

6.急性化脓性骨髓炎最可靠的诊断依据是

- A. 血中白细胞计数升高
- B. X线片局部骨膜反应和骨质破坏
- C. 皮肤红、肿、热、痛、功能障碍

D. 骨膜下穿刺有脓液

E. 血沉加快

解析：局部脓肿分层穿刺，抽出浑浊或血性液（可做涂片与细菌培养和药敏试验）。D

7. 急性骨髓炎早期手术的目的是

A. 切除病灶

B. 消灭死腔

C. 清除死骨和窦道

D. 预防病理性骨折

E. 防止急性骨髓炎转变为慢性骨髓炎

解析：手术治疗的目的是防止骨髓炎由急性期向慢性阶段发展及死骨形成。C

8. 急性骨髓炎早期最常用的手术方式是

A. 骨开窗术

B. 病骨切除术

C. 肌瓣填塞术

D. 切开减压和引流脓液

E. 蝶形手术

解析：常用手术治疗方式：急性期钻孔引流或开窗减压，伤口闭式灌洗引流；慢性期手术清除死骨和炎性肉芽组织，消灭无效腔以闭合伤口，还可采用二期植骨或肌瓣堵塞消灭无效腔。D

9. 急性血源性骨髓炎好发部位在

A. 长骨的干骺端

B. 骨膜及骨皮质

C. 长骨的骨干

D. 骨营养孔

E. 骨髓

解析：急性血源性骨髓炎是指细菌从体内其他部位感染灶经血循环播散至骨骼而引起的化脓性细菌感染。本病好发于儿童。好发部位是：股骨、胫骨和肱骨的干骺端。A

10. 急性血源性骨髓炎好发于下列哪个年龄段

A. 1—3 岁幼儿

B. 3—15 岁儿童

C. 15—25 岁

D. 25—40 岁

E. 40 岁以上

解析：急性血源性骨髓炎是指细菌从体内其他部位感染灶经血循环播散至骨骼而引起的化脓性细菌感染。本病好发于儿童。好发部位是：股骨、胫骨和肱骨的干骺端。B

11. 急性骨髓炎行开窗引流冲洗术后，3 天内最主要的护理是

A. 鼓励病人早期活动

B. 保持引流通畅

- C. 观察体温变化
- D. 加强饮食护理
- E. 患肢制动

解析：钻孔或开窗引流术后 24h 内快速(呈流水样)灌洗，以后每 2h 快速冲洗 1 次，维持冲洗直至引流液清亮；观察和记录引流液的性质、颜色及量，记录出入量；保证引流通畅，严格无菌操作，防止发生逆行感染。B

12. 以下对急性血源性骨髓炎早期诊断最有帮助的是

- A. X 线摄片
- B. 白细胞升高
- C. 高热
- D. 局部脓肿分层穿刺
- E. 疼痛

解析：急性血源性骨髓炎早期局部脓肿分层穿刺，抽出浑浊或血性液，可做涂片细菌培养和药敏试验以明确诊断并指导临床用药。D