

食管癌病人的护理

1. 食管癌手术后最严重的并发症是

- A. 肺炎、肺不张
- B. 吻合口瘘
- C. 吻合口狭窄
- D. 乳糜胸
- E. 出血

解析：由于食管本身的解剖特点，术后易发生吻合口瘘，一旦发生，会引起严重的胸腔内感染，严重者可危及生命。

2. 食管癌切除至少应包括肿瘤上下端的长度是

- A. 3cm
- B. 5cm
- C. 7cm
- D. 8cm
- E. 9cm

解析：手术治疗目前是食管癌主要的治疗方法。早中期病人可手术切除距肿瘤上下各 5cm~8cm 的食管及所属区域的淋巴结，然后行胃代食管术或结肠、回肠代食管术。晚期病人，可行胃、空肠或结肠与肿瘤上方食管吻合术等，以改善症状。

3. 食管癌典型症状是

- A. 进食时哽噎感
- B. 胸骨后刺痛
- C. 进行性吞咽困难
- D. 食管内异物感
- E. 呛咳、呕吐

解析：食管癌早期症状不明显，当病人咽下食物出现的哽噎感、胸骨后疼痛及异物感时，常为肿瘤的早期表现。典型症状是进行性吞咽困难。初期进食干硬食物感到不畅或呃逆，继而进食软食或半流质也感不畅，以致发展到进食流质也感困难。最终可发展致滴水不进。

4. 我国用于普查早期食管癌的方法是

- A. 胸部 CT
- B. 食管镜检查
- C. 病理切片检查
- D. X 线钡餐检查
- E. 食管拉网脱落细胞学检查

解析：食管拉网脱落细胞学检查是常用普查的方法，阳性率可高达 90%，是诊断早期食管癌的可靠方法之一。

5. 护理食管癌根治术后病人，应特别注意

- A. 做好心理护理
- B. 维持体液平衡
- C. 严格控制进食时间
- D. 保持排尿、排便通畅
- E. 鼓励早期活动

解析：食管缺乏浆膜层，故吻合口愈合较慢，术后应严格控制饮食，严格禁食水 4~6 天。禁食期间，每天由静脉补液。

6. 对食管癌病人护理措施错误的是

- A. 术前教会深呼吸，咳嗽

- B. 手术前后作好口腔护理
- C. 术后保持胃肠减压通畅
- D. 术后三天可以进食
- E. 术后指导病人功能锻炼

解析：D

7. 食管癌切除术后最严重的并发症是

- A. 乳糜胸
- B. 吻合口瘘
- C. 吻合口狭窄
- D. 心律失常
- E. 肺不张

解析：B

8. 食管癌病人进食呛咳提示

- A. 癌侵犯舌咽神经
- B. 上段食管癌
- C. 食管气管瘘
- D. 癌肺转移
- E. 伴有气管炎

解析：C

9. 与食管癌发病因素无关的是

- A. 水和土壤中钼含量低
- B. 粮食中亚硝胺含量高
- C. 遗传因素
- D. 食管慢性刺激
- E. 大气污染

解析：E

10. 食管癌手术后7日，观察中发现病人呼吸困难、胸腔积液、全身中毒症状，白细胞升高。

以下判断和处理正确的是

- A. 吻合口瘘，嘱病人立即禁食
- B. 吻合口瘘，嘱病人流质饮食
- C. 肺炎、肺不张，嘱病人深呼吸
- D. 乳糜胸，嘱病人立即禁食
- E. 肺炎、肺不张，给病人拍背、翻身

解析：食管吻合口瘘是食管癌术后最常见的并发症，常表现在进食后出现高热、脉快、呼吸困难、胸部剧痛、不能忍受；患侧呼吸音低，叩诊浊音，白细胞升高甚至发生休克，一旦发现须立即禁饮食，胃肠减压，必要时再次手术处理。A