

## 第十章 老年临终关怀

### 一、A1 题型

[[[

1. 临终患者最早出现的心理反应是

- A. 忧郁期                      B. 愤怒期                      C. 否认期  
D. 接受期                      E. 协议期

zj: (1) 临终老年人的心理变化 nd:易 nian: 2013 ly: jb: #C

jx: 临终患者一般都要经过 5 个心理阶段: 否认期-愤怒期-协议期-忧郁期-接受期。

]]]

[[[

2. 护理临终患者哪项不妥

- A. 要有坦率诚实的态度                      B. 要认真听取患者的主诉  
C. 要充分体谅患者的痛苦                      D. 要制止患者的愤怒表现  
E. 要尊重患者的选择

zj: (2) 临终老年人心理护理的护理措施 nd:易 nian: 2013 ly: jb: #D

jx: 面对临终愤怒期的患者应尽可能创造条件达到其最大满足。不要把患者的攻击看成是对某个人, 也不要愤怒的表现去反击他, 不要告诉患者“不应该这样做,” “不应该那样说,” 让患者发泄她的愤怒和倾泻她的感情。

]]]

[[[

3. 濒死患者的护理, 下列哪项不妥

- A. 应有专人护理                      B. 严密观察病情                      C. 立即通知医生  
D. 不允许家人陪伴                      E. 保持病室空气新鲜

zj: (2) 临终老年人生理护理的护理措施 nd:易 nian: 2013 ly: jb: #D

jx: 濒死期的患者应该有家人陪伴。

]]]

[[[

4. 临终老年人最常见最严重的症状是

- A. 疼痛
- B. 意识模糊
- C. 呼吸困难
- D. 出血
- E. 大小便失禁

zj: (1) 临终老年人的生理变化 nd:易 nian: 2013 ly: jb: #A

jx:临终老年人最常见最严重的症状是疼痛。

]]]

[[[

5. 濒死期循环衰竭的临床表现不包括

- A. 心音低而无力
- B. 皮肤淤血斑点
- C. 脉搏弱而不规则
- D. 口唇指甲青紫
- E. 血压上升

zj: (1) 临终老年人的生理变化 nd:易 nian: 2013 ly: jb: #E

jx:濒死期循环衰竭血压应下降直至测不到。

]]]

[[[

6. 濒死期患者的心理表现第三期是

- A. 否认期
- B. 接受期
- C. 愤怒期
- D. 忧郁期
- E. 协议期

zj: (1) 临终老年人的心理变化 nd:易 nian: 2013 ly: jb: #E

jx:临终患者一般都要经过5个心理阶段：否认期-愤怒期-协议期-忧郁期-接受期。

]]]

[[[

7. 临终关怀的根本目的是

- A. 提高临终患者的生存质量
- B. 减轻家庭的经济负担
- C. 加速患者死亡
- D. 防止患者自杀
- E. 节约卫生资源

zj: (1) 临终关怀的概念 nd:易 nian: 2013 ly: jb: #A

jx:临终关怀对晚期患者照顾的重点不再是如何延长生命，也不是用人工的方法结束患者的生命，而是着力提高晚期患者生存价值和生命质量，为他们提供一个安适、有意义、有尊严、有希望的生活，让晚期患者在有限的生命时间和空

间里，享受生命所赋予他们的幸福和快乐。

]]]

[[[

8. 不属于临终关怀的内容是

- A. 提高患者的生存质量
- B. 延长患者的生存时间
- C. 让濒死患者减少身心痛苦
- D. 得到关怀和照顾
- E. 使他们有尊严、宁静、坦然的辞别人生

zj:3 临终关怀的观念 nd:易 nian: 2013 ly: jb: #B

jx:临终关怀对晚期患者照顾的重点不再是如何延长生命，也不是用人工的方法结束患者的生命，而是着力提高晚期患者生存价值和生命质量。

]]]

[[[

9. 居丧照护的内容不包括

- A. 陪伴与聆听患者家属
- B. 协助办理后事
- C. 协助家属表达内心的悲痛情绪
- D. 协助家属适应新生活
- E. 负责遗产的分配

zj: (2) 居丧照护的内容和方法 nd:易 nian: 2013 ly: jb: #E

jx:居丧照护的内容：陪伴与聆听、协助办理后事、协助家属表达内心的悲痛情绪、协助家属适应新生活。

]]]

[[[

10. 老年临终病人临终前最常见的症状是

- A. 疼痛
- B. 恶心呕吐
- C. 头晕
- D. 压疮
- E. 以上都不正确

zj: (1) 临终老年人的生理变化 nd:较易 nian: 2014 ly: jb: #A

jx:老年临终病人临终前最常见的症状是疼痛。

]]]

[[[

11. 临终病人表现出怨天尤人，责怪命运不公，迁怒他人。根据美国精神病学



D. 忧郁期

E. 解脱期

zj: (1) 临终老年人的心理变化 nd:中 nian: 2013 ly: jb: #D

jx: 忧郁期患者看到自己向死亡走进，毫无疑问地承认“是啊——是我，”表现明显的忧郁、深沉的悲哀，并时常哭泣。

]]]

[[[

2. 患者，大学教授，胃癌晚期，当得知自己的病情后极端害怕死亡，十分留恋人生。不惜代价到处求医，冥思苦想寻找起死回生的药方，此老年人对待死亡的心理类型为

A. 理智型

B. 积极应对型

C. 恐惧型

D. 接受型

E. 解脱型

zj:1 老年人对待死亡的心理类型 nd:较难 nian: 2013 ly: jb: #C

jx: 恐惧型老年人极端害怕死亡，十分留恋人生。这类老年人一般都有较好的社会地位、经济条件和良好的家庭关系。他们指望着能在老年享受天伦之乐，看到儿女成家立业、兴旺发达。表现往往会不惜代价，冥思苦想，寻找起死回生的药方，全神贯注于自己的机体功能。

]]]

[[[

3. 患者已去世2天，但患者家属诉说经常感觉到死者陪伴在身边，经常看到死者的影子，听到死者的声音，患者家属此时处于哪一个阶段

A. 麻木阶段

B. 渴望阶段

C. 颓丧阶段

D. 复元阶段

E. 以上都不是

zj: (1) 派克斯提出的悲伤反应4阶段理论 nd:较难 nian: 2013 ly: jb: #B

jx: 渴望阶段表现为：麻木反应之后是内心的悲痛，并常表现为渴望见到已逝去的亲人，真切的希望死去的人能够回来。虽然知道寻找死去的人是无用的事，但他们仍然反复思考死者去世前发生的事情，这样做似乎可以发现以前有什么地方出了错，现在可以纠正过来。有时家属会强烈感觉到死者的存在，经常看到死者的影子，或听到死者的声音。

]]]

