

面容枯槁、面色苍白或铅灰、表情淡漠、眼眶凹陷称为(A)

- A. 慢性病容
- B. 危重病容
- C. 满月病容
- D. 二尖瓣病容
- E. 急性病容

患者无自主运动，呼之不应，瞳孔对光反射存在压迫眶上神经出现痛苦表情，此情况属于(C)

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 浅昏迷
- D. 深昏迷
- E. 意识模糊

双侧瞳孔缩小见于(D)

- A. 颅内压增高
- B. 阿托品中毒
- C. 脑疝
- D. 乐果中毒
- E. 硬脑膜下血肿

患者，因脑部外伤而入院手术，术后第2天患者处于可以唤醒又随后入睡、对所提问题能正确回答的状态。该患者的意识状态处于何种情况(B)

- A. 晕厥
- B. 嗜睡
- C. 谵妄
- D. 浅昏迷
- E. 意识模糊

用电动吸引器吸痰，每次吸痰时间不宜超过(C)

- A. 5s
- B. 10s
- C. 15s
- D. 20s
- E. 25s

氧气吸入的适应证是(E)

- A. CO 中毒
- B. 心力衰竭
- C. 头颅损伤
- D. 哮喘发作时
- E. 以上均正确

下述用氧疗方法正确的是(D)

- A. 氧气筒应至少距火炉 1m、暖气 5m
- B. 氧气表及螺旋口上应涂油润滑
- C. 用氧时，先插入鼻导管再调节氧流量
- D. 停用氧时，先拔出鼻导管再关闭氧气开关
- E. 持续用氧者，每周更换鼻导管 2 次

对氧气湿化瓶的处理不妥的是(B)

- A. 装入冷开水
- B. 瓶内水量为 2/3 满
- C. 通气管浸入液面下
- D. 雾化吸入时瓶内不放水
- E. 湿化瓶定时更换

吸氧浓度为 33%，每分钟氧流量为(C)

- A. 1L
- B. 2L

- C. 3L
- D. 4L
- E. 5L

洗胃目的不包括(E)

- A. 清除胃内刺激物
- B. 减轻胃黏膜水肿
- C. 用灌洗液中和毒物
- D. 手术或检查前准备
- E. 排除肠道积气

中毒物质不明的患者,用电动吸引法洗胃,下述哪项不妥(D)

- A. 洗胃液用等渗盐水
- B. 电动吸引器压力为 13.3kPa (100mmHg)
- C. 插管动作轻快
- D. 每次灌入量以 200ml 为限
- E. 洗胃过程患者诉腹痛或流出血性灌洗液,应停止

下列哪种药物中毒忌用碳酸氢钠溶液洗胃(A)

- A. 敌百虫
- B. 敌敌畏
- C. 乐果
- D. 乙基对硫磷 (1605 农药)
- E. 内吸磷(1059 农药)

为成人实施心脏按压,应使胸骨下陷(E)

- A. 1~2cm
- B. 2~4cm
- C. 3~5cm
- D. 4~5cm

E. 5~6cm

患者女, 65 岁。因肺源性心脏病收住院治疗。 护士收集资料时了解到: 患者口唇发绀, 呼吸困难, 食欲缺乏, 口腔溃疡, 焦虑。应首先执行的护理措施是(E)

- A. 与其交谈, 解除焦虑
- B. 调节食谱, 促进食欲
- C 通知家属来医院探望
- D. 行口腔护理促进溃疡愈合
- E. 吸氧、缓解缺氧

大叶性肺炎的病人体温 40. 2℃, 脉搏细速, 血压 90/60mmHg, 观察病情应特别注意(E)

- A. 昏迷
- B. 昏厥
- C. 休克
- D. 心律失常
- E. 惊厥

患者因车祸而致右下肢开放性骨折, 大量出血, 被送至急诊室。在医生未到之前, 当班护士应立即(E)

- A. 询问发生车祸的原因
- B. 向保卫部门报告
- C. 给患者注射镇静剂
- D. 劝患者耐心等待医生
- E. 给患者止血、测血压, 建立静脉输液通路

密切观察血压, 精确纪录尿量的是(D)

- A. 极度衰竭
- B. 脑溢血
- C. 肺性脑病
- D. 极度肾功能衰竭

E. 肝昏迷

护士甲在参与抢救失血性休克的患者时需要电话联系上级主管医师,在执行电话医嘱时应注意(E)

- A. 听清医嘱立即执行
- B. 听到医嘱后直接执行
- C. 迅速执行自己听到的医嘱
- D. 听到医嘱应简单复述一次
- E. 重复一次, 确认无误后执行

患者女性, 35 岁, 因慢性贫血入院, 护士收集资料时选用的方法错误的是(E)

- A. 查阅实验室检查的结果
- B. 护士与王某进行交谈
- C. 对患者进行身体评估
- D. 与患者的家属沟通
- E. 护士的主观感觉

患者男性, 50 岁。以“急性阑尾炎”收住院。入院观察患者呈急性面容, 蜷曲体位。这种收集资料的方法属于(A)

- A. 视觉观察法
- B. 触觉观察法
- C. 听觉观察法
- D. 嗅觉观察法
- E. 味觉观察法

不属于正常人意识的表现是(D)

- A. 思维合理
- B. 语言清晰
- C. 表达正确
- D. 情感欣快

E. 定向力正常

角膜反射消失见于(E)

A. 意识模糊

B. 昏睡

C. 嗜睡

D. 浅昏迷

E. 深昏迷

患者女性，76岁。高浓度吸氧2天，提示患者可能出现氧中毒的表现是(D)

A. 轻度发绀

B. 显著发绀

C. 三凹征明显

D. 干咳、胸痛

E. 动脉血 $\text{PaCO}_2 > 12.0 \text{kPa}$

患者女性，52岁。与家人争吵后服下半瓶敌敌畏，洗胃时每次灌入的溶液量应为(C)

A. 100~200ml

B. 200~300ml

C. 300~500ml

D. 400~600ml

E. 500~700ml

瞳孔直径的正常范围是(B)

A. 1.5~2mm

B. 2~5mm

C. 3.5~4mm

D. 4.5~5mm

E. 5.5~6mm

判定瞳孔缩小，其直径至少应小于(A)

- A. 2mm
- B. 3mm
- C. 4mm
- D. 5mm
- E. 6mm

判定瞳孔扩大，其直径至少应大于(D)

- A. 2mm
- B. 3mm
- C. 4mm
- D. 5mm
- E. 6mm

可引起双侧瞳孔扩大的药物中毒是(C)

- A. 乐果
- B. 氯丙嗪
- C. 颠茄酊
- D. 吗啡
- E. 苯巴比妥

女性患儿，2岁。呼吸困难，给予氧疗，合适的方法是(E)

- A. 鼻导管法
- B. 鼻塞法
- C. 面罩法
- D. 氧气枕法
- E. 头罩法

患者女性，54岁。近几日持续出现胸前区疼痛，就诊过程中患者突然发生意识模糊，面色苍白，血压测不出。医护人员立即为其进行CPR。护士评估患者的重点内容是(D)

- A. 表情
- B. 尿量
- C. 肌张力
- D. 大动脉搏动
- E. 中心静脉压

采用强迫体位是因为(E)

- A. 神志不清
- B. 意识丧失
- C. 极度衰竭
- D. 保证安全
- E. 减轻病痛

采用被动体位的病人是(D)

- A. 胸膜炎
- B. 心力衰竭
- C. 支气管哮喘
- D. 昏迷
- E. 心包积液

患者男性，因敌百虫中毒急送医院，护士为其洗胃。禁用的洗胃溶液是(C)

- A. 高锰酸钾
- B. 生理盐水
- C. 碳酸氢钠
- D. 温开水
- E. 牛奶

患者女性，25岁。夜间急诊入院，患者表情很痛苦、呼吸急促，伴有鼻翼扇动，口唇有疱疹，面色潮红，测体温 39℃，该患者属于(A)

- A. 急性病容

- B. 慢性病容
- C. 病危病容
- D. 休克病容
- E. 恶性病容

车祸现场有一患者，男性，40岁，意识清楚，面色苍白，表情淡漠，目光无神，主诉腹痛，该患者应考虑(B)

- A. 急性腹膜炎
- B. 大出血
- C. 大叶性肺炎
- D. 甲亢
- E. 脱水

不属于急救器械的物品是(D)

- A. 人工气胸器
- B. 心电图机
- C. 电动洗胃机
- D. 纤维胃镜
- E. 简易呼吸器

禁忌洗胃的患者是(C)

- A. 幽门梗阻者
- B. 昏迷者
- C. 食管静脉曲张者
- D. 胆囊炎患者
- E. 胃炎患者

某患者正在行氧气疗法，其流量表指示为流量为4L/min，该患者的吸入氧浓度是(D)

- A. 21%
- B. 26%

C. 49%

D. 37%

E. 41%

痰液阻塞呼吸道不会引起(C)

A. 窒息

B. 肺不张

C. 肺梗死

D. 呼吸困难

E. 发绀

用吸痰管进行气管内吸痰的方法应(C)

A. 自上而下抽吸

B. 自下而上抽吸

C. 左右旋转向上提吸

D. 上下移动导管进行抽吸

E. 固定于一处抽吸