

填空题

1. 前列腺位于膀胱与_之间，前列腺底与_、_和_相邻，前列腺尖的两侧有_绕过。
2. 前列腺的基本断面有_、_、_和_、_是前列腺断面长轴及斜轴的重要解剖标志。
3. Lowsley 根据胚胎时期前列腺的研究，将其分为_、_、_、_和_5叶，其中射精管与尿道之间的腺组织称为_。
4. Franks 根据前列腺的组织结构，将其分为_和_，两者之间有一层_相分隔。
5. 外腺约占前列腺的_%，主要含有长而分支的_，相当于 Lowsley 分区法的_和_，是_的好发部位。
6. 内腺约占前列腺的_%，含有_和_，相当于 Lowsley 分区法中的_和_，是_的好发部位。
7. McNeal 根据前列腺的矢状、冠状断面将其腺体分为_、_、_和_4区。
8. 宽阔的阴道上部包绕子宫颈阴道部，两者之间形成的环形凹陷称为_，可分为_、_和_，其中以_最深，隔阴道后壁与直肠子宫陷凹相邻。
9. 子宫体下部与子宫颈之间的狭窄部分为_，长约_，其随妊娠而逐渐伸展。
10. 子宫内腔以子宫峡为界分为上方的_和下方的_，其向上外侧经_通向腹膜腔，向下经_通向阴道。
11. 耻骨弓由_和_形成，在横断层上呈_形。
12. 盆腔筋膜包绕男性盆腔脏器分别形成_、_和_筋膜鞘，女性盆筋膜伸入女性阴道与膀胱底、尿道和直肠之间分别形成_、_和_隔。
13. 前列腺的 MRI T₁ 呈_信号影，不能区分各解剖带区；MRI T₂ 因_和_的差异而呈现不同信号影。
14. 卵巢在 CT 平扫呈_影，MRI T₁ 呈_信号影，MRI T₂ 的卵泡呈_信号影。
15. 在 MRI T₂ 上，子宫壁的内层呈高信号带，相当于_和_，并可显示出其周期性变化规律；外层呈中等信号带，相当于_；中层为一薄层的低信号带，相当于_。

16. 经耻骨联合横断层上的男性盆腔脏器自后向前为_和_及其内的_。
17. 在盆部横断层上,前列腺呈_状,其_径明显大于_径,当前列腺病变时其_径增大,等于或超过_径。
18. 盆膈上、下筋膜和肛提肌、尾骨肌共同形成盆膈,呈_状,前份有盆膈裂孔,其下方被_和_形成的尿生殖膈所封闭,内有_(男性)或_(女性)通过。
19. 在女性盆部横断层上,耻骨联合后方依次为_、_和_,其两侧是呈"U"字形的_。
20. 在女性耻骨联合横断层下方,中线两侧依次出现 4 个呈"八"字形的结构,即 _、_、_和_。
21. 在会阴的横断层上,阴部管位于_的后内侧,居_内;阴部管内有_和_通过。
22. 在会阴横断层上,阴道根据其周围结构分为 3 段,_为上段,_方是中段,_的后方是下段。
23. 在髋关节上份的横断层上,女性维脏器自前向后为_、_和_,其周围分别有_、_和_静脉丛,盆腔脏器的腹膜之间形成_和_陷凹。
24. 在盆部横断层上,卵巢位于_和(或)_ 的两侧,与子宫之间有_和_相连。
25. 男性盆部与会阴的横断层以_和_为界分为 3 段,其内的主要结构分别为_、_和_。
26. 在会阴横断层上,坐骨肛门窝呈三角形,由前外侧的_、前内侧_和后方的_围成,随横断层下移则逐渐增大,至肛区皮肤出现时消失。