

肺炎

- 肺炎引起全身各系统病理生理变化的关键是：
 - 病原体的侵入
 - 毒素的作用
 - 组织破坏
 - 缺氧二氧化碳潴留
 - 通气阻碍
- 婴幼儿肺炎最常见的并发症是：
 - 心力衰竭
 - 中毒性肠麻痹
 - 酸中毒
 - 呼吸衰竭
 - 低钾血症
- 重症肺炎发生腹胀，多由于：
 - 低血钾
 - 中毒性肠麻痹
 - 消化不良
 - 消化道粘膜损害
 - 低钙血症
- 金葡菌肺炎易发生：
 - 休克
 - 心力衰竭
 - 肺大泡、脓气胸
 - 中毒性肠麻痹
 - 哮喘
- 处理呼吸衰竭，下列哪项不对：
 - 保持呼吸道通畅
 - 氧气疗法
 - 用呼吸兴奋剂
 - 25%硫酸镁缓慢静滴
 - 补充液体
- 肺炎患者突然出现呼吸道梗阻症状，紧急措施是：
 - 清理呼吸道分泌物
 - 吸氧
 - 人工呼吸
 - 用镇咳药
 - 用地高辛
- 判断肺炎轻重程度主要根据：
 - 肺部啰音多少
 - 缺氧程度
 - 有无心衰、脑病等其他症状
 - 精神状况
 - 以上都不是
- 抗生素治疗肺炎停药指征是：
 - 体温正常即可停药
 - 体温正常，肺部体征消失后再用5—7天
 - X线正常后
 - 体温正常后半月
 - 呼吸正常
- 按病理分类婴幼儿最常见的肺炎是
 - 支气管肺炎
 - 大叶性肺炎
 - 间质性肺炎
 - 干酪性肺炎
 - 细支气管炎
- 支气管炎及肺炎的区别要点是：
 - 发热咳嗽重
 - 呼吸音粗
 - 固定的湿啰音
 - 白细胞增高
 - 发热程度

11. 婴幼儿肺炎给氧的主要条件为：

A. 发热咳嗽 B. 双肺密集中小水泡音 C. 合并脓胸 D. 烦躁不安，口周发绀 E. 呼吸音粗

12. 6个月男孩，急起喘憋1天，烦躁不安，体温38.1，呼吸70次/分，心率156次/分，满肺哮鸣音，肝肋下1.5cm，应诊断为：

A. 支气管炎 B. 腺病毒肺炎 C. 支气管肺炎并心衰 D. 哮喘性支气管炎 E. 呼吸道合胞病毒肺炎

13. 4个月男孩，患肺炎，体温40℃，两眼上翻，前囟紧张，惊厥，脑脊液正常，首先考虑合并：

A. 高热惊厥 B. 中毒性脑病 C. 化脑 D. 低血钙 E. 低钾血症

15. 肺炎患儿经用青霉素1天，未退热，应该：

A. 加三联抗生素 B. 加用激素 C. 立即改用其他抗生素 D. 用2—3天无效再改用其他药 E. 停止治疗

16. 1岁患儿，发热咳嗽3天入院，治疗中出现呼吸急促，鼻扇，发绀，三凹征，呼吸60次/分，心率180次/分，双肺细小水泡音，最可能的诊断是：

A. 支气管肺炎 B. 喘憋性肺炎 C. 喘息性支气管炎 D. 支气管肺炎合并心衰 E. 脓胸

17. 肺炎首要的护理措施是：

A. 保持呼吸道通畅 B. 吸氧 C. 维持体温正常 D. 应用抗生素 E. 控制饮食

18. 肺炎首要的护理诊断是：

A. 清理呼吸道无效 B. 活动无耐力 C. 体温过高 D. 心力衰竭 E. 气体交换受损

19. 小儿肺炎发热持续不退或退而复升，应考虑：

A. 脓胸 B. 肺不张 C. 毒血症 D. 心力衰竭 E. 气胸

20. 小儿肺炎合并心力衰竭主要是由于

A. 心率过快 B. 末梢循环衰竭 C. 弥散性血管内凝血 D. 肺动脉高压和中毒性心肌炎 E. 循环淤血

21. 婴幼儿肺炎最易出现的并发症是

- A. 心力衰竭 B. 中毒性脑病 C. 中毒性肠麻痹 D. 脓气胸 E. 呼吸衰竭
22. 以下哪项不符合婴幼儿肺炎合并心力衰竭的诊断标准
- A. 心率加快， $>180/\text{min}$ B. 呼吸加快， $>60/\text{min}$ C. 烦躁不安，发绀
D. 肝右肋下 1cm E. 心音低钝，奔马律
23. 肺炎易合并脓胸、脓气胸的常见病原体是
- A. 肺炎球菌 B. 溶血性链球菌 C. 金黄色葡萄球菌 D. 铜绿假单胞菌 E. 白色念珠菌
24. 引起婴幼儿肺炎最常见的病原体是
- A. 金黄色葡萄球菌 B. 呼吸道合胞病毒 C. 肺炎支原体 D. 大肠杆菌 E. 肺炎链球菌
25. 儿童诱发支气管扩张最多见的原因是
- A. 支气管哮喘 B. 营养不良 C. 支气管肺炎 D. 支气管发育缺损 E. 原发综合征
26. 某肺炎合并心力衰竭患儿用饱和量地高辛。用药前护士须先测量患儿的
- A. 体温 B. 脉搏 C. 呼吸 D. 血压 E. 意识
27. 支气管肺炎患儿宜采取的体位是
- A. 头高位或半卧位 B. 头侧平卧位 C. 去枕平卧位 D. 右侧卧位 E. 左侧卧位
28. 支气管肺炎与支气管炎主要鉴别点是
- A. 发热的高低 B. 咳嗽的轻重 C. 痰液的多少 D. 肺部是否有固定的中小水泡音 E. 血白细胞的高低
29. 男，3岁，患支气管肺炎。如需输液，滴速应控制在每小时
- A. $5\text{ml}/\text{kg}$ B. $10\text{ml}/\text{kg}$ C. $15\text{ml}/\text{kg}$ D. $20\text{ml}/\text{kg}$ E. $30\text{ml}/\text{kg}$
30. 小儿重症肺炎，最常见的酸碱平衡紊乱
- A. 代谢性酸中毒 B. 呼吸性酸中毒 C. 代谢性碱中毒 D. 呼吸性碱中毒 E. 混合性酸中毒
31. 诊断肺炎患儿“气体交换受损”的主要依据是
- A. 呼吸困难 B. 发绀 C. 烦躁不安 D. 血气分析结果 E. 肺部湿啰音

32. 患儿，7岁，发热、咳嗽、咳痰6天，痰液粘稠，不易咳出。查体：体温37.5℃，呼吸24次/分，肺部听诊有少量湿啰音。以下哪项护理措施最恰当

- A. 立即物理降温 B. 给予镇咳药 C. 面罩吸氧
D. 对患儿及家长进行健康指导 E. 超声雾化吸入，保持呼吸道通畅

33. 患儿，4个月，支气管肺炎，突然烦躁不安，呼吸急促，三凹征明显。心率188次/分，心音低钝，肝肋下4cm。该患儿可能并发了

- A. 急性心力衰竭 B. 感染性心内膜炎 C. 肺不张 D. 脓胸、脓气胸 E. 肺大疱

34. 患儿，3个月，急性支气管肺炎。1周来高热持续不退，咳嗽加重，呼吸困难伴口唇发绀。左侧肋间隙饱满，呼吸运动减弱，叩诊呈浊音，听诊呼吸音减弱。该患儿可能并发了

- A. 心力衰竭 B. 呼吸衰竭 C. 脓胸 D. 气胸 E. 肺大疱

35. 肺炎患儿发生严重腹胀、肠鸣音消失是因为

- A. 低钾血症 B. 低钠血症 C. 坏死性小肠炎 D. 消化功能紊乱 E. 中毒性肠麻痹

36. 小儿肺炎的护理措施哪项不妥

A. 鼓励患儿多饮水，防止痰液粘稠不易咳出 B. 雾化吸入稀释痰液 C. 输液时要控制液量和速度

- D. 喘憋较重时镇静平卧 E. 严密观察病情及时发现并发症

37. 1岁肺炎患儿，喘憋明显、发绀、持续高热，经多种抗生素治疗无好转，该患儿感染的病原体可能是

- A. 金黄色葡萄球菌 B. 肺炎链球菌 C. 腺病毒 D. 大肠杆菌 E. 流感嗜血杆菌

38. 患儿，2岁，因肺炎伴急性心力衰竭需立即进行抢救，首选的药物是

- A. 地高辛口服 B. 洋地黄肌内注射 C. 硝普钠静脉点滴

- D. 毒毛旋花子甙K缓慢静脉注射 E. 酚妥拉明静脉点滴

39. 小儿，男，7个月，以支气管肺炎收入院。4h后突然出现烦躁，喘憋加重，发绀，心率190/min，心音低钝，肝肋下3cm，患儿可能出现

- A. 心力衰竭 B. 脓气胸 C. 肺不张 D. 中毒性心肌炎 E. 肺大疱

40. 2岁女婴患肺炎，其中一护理诊断为体温过高，请问下列哪项是主要诊断依据

A. 皮肤发红、触之有热感 B. 体温高于正常范围 C. 呼吸心跳加快 D. 痉挛或惊厥 E. 不能出汗

患儿，8个月，肺炎，现突然烦躁不安，发绀且进行性加重，体检：R60次/分，P170次/分，心音低钝，两肺布满细湿啰音，此时诊断为肺炎合并心力衰竭，

41. 心力衰竭缓解的主要指标是

A. 烦躁不安缓解 B. 呼吸频率减慢 C. 呼吸困难缓解 D. 肺部湿啰音消失 E. 心率减慢

42. 给患儿进行饮食护理时应注意

A. 多进甜食 B. 应足量 C. 多进盐 D. 多饮水 E. 少盐或无盐

43. 给患儿用强心苷时为预防中毒反应须做到

A. 注射前先测心率 B. 心率 <100 次/分，应报告医生 C. 可与其他药物混合注射

D. 注射速度宜快 E. 及时补充含钙食品

44. 对该患儿首先采取的护理措施是

A. 设法让患儿安静 B. 清理患儿呼吸道 C. 观察病情变化 D. 患儿取右侧卧位 E. 限制钠水入量

45. 此时给予的护理操作哪项不妥

A. 监测患儿生命体征 B. 减慢输液速度 C. 及时给氧气吸入

D. 给患儿做体位引流以帮助排痰 E. 按医嘱给强心苷药物

46. 男孩，10岁，2周末发热、咳嗽，以干咳为主，肺部体征不明显，用青霉素治疗效果不明显，该小儿考虑的诊断是

A. 大叶性肺炎 B. 呼吸道合胞病毒肺炎 C. 腺病毒肺炎 D. 葡萄球菌肺炎 E. 支原体肺炎

47. 上题小儿首选的治疗药物为 A. 青霉素 B. 红霉素 C. 氯霉素 D. 先锋霉素 E. 干扰素

48. 6个月女婴，4天来咳嗽，发热38~39℃。生后母乳喂养，2个月来每天加鱼肝油2滴，平时多汗。查体：呼吸70次/分，心率184次/分，三凹征(+)，两肺散在中小湿啰音，肝肋下3.5cm，有枕秃，按压枕骨有乒乓球感。此患儿应考虑为

- A. 支气管肺炎 B. 支气管肺炎、心力衰竭 C. 支气管肺炎、佝偻病早期
D. 支气管肺炎、心力衰竭、佝偻病激期 E. 支气管肺炎、心力衰竭、佝偻病初期

49. 8个月女婴，5天来频咳，喘憋，持续高热。查体：体温39.5℃，精神萎靡，嗜睡与烦躁交替，口周发绀，两肺呼吸音粗，可闻少量干啰音，X线胸片可见右下肺大片状阴影。临床诊断考虑为

- A. 腺病毒肺炎 B. 肺炎支原体肺炎 C. 金黄色葡萄球菌肺炎 D. 呼吸道合胞体肺炎 E. 急性支气管炎

50. 6个月男婴，3天来高热、咳嗽，精神萎靡，纳差，时有呕吐，大便稀每日3~4次，周围血WBC $20 \times 10^9/L$ ，查体：烦躁不安，气促，面色苍白，皮肤可见猩红热样皮疹，两肺可闻中小湿啰音。诊断为

- A. 腺病毒肺炎 B. 肺炎支原体肺炎 C. 金黄色葡萄球菌肺炎
D. 肺炎链球菌肺炎 E. 呼吸道合胞体病毒肺炎

51. 8岁男孩，1周来发热、咳嗽，2天来加重，曾用青霉素3天无效。查体：体温38℃，右后下肺呼吸音减低，胸片发现左上肺小片状淡薄云絮状阴影。该患儿考虑为

- A. 呼吸道合胞体病毒肺炎 B. 肺炎支原体肺炎 C. 大叶性肺炎 D. 金黄色葡萄球菌肺炎
E. 腺病毒肺炎