

1.急性肾小球肾炎属于哪种性质的疾病

- A.感染后免疫反应性疾病 B.病毒直接感染肾脏 C.细菌直接感染肾脏
D.单侧肾脏化脓性炎症 E.双侧肾脏化脓性炎症

2.急性肾小球肾炎尿呈浓茶色，是由于

- A.尿液为酸性 B.尿相对密度增高 C.尿酸盐结晶 D.饮水少 E.尿蛋白太高

3.急性肾小球肾炎持续较久的临床表现是

- A.水肿 B.高血压 C.肉眼血尿 D.镜下血尿 E.恶心、呕吐

4.关于急性肾炎的临床表现，下列哪项是错误的

- A.多数病人都有血尿 B.起病后第1周常有高血压 C.水肿为首发症状，常为上行性
D.起病1—2周内可发生严重循环充血 E.血压突然升高，应注意高血压脑病

5.急性肾小球肾炎患儿可以下床散步标准是

- A.尿常规正常 B.血沉补体正常 C.血压下降，肉眼血尿消失
D.尿阿迪计数正常 E.抗链球菌溶血素O效价正常

6.急性肾小球肾炎患儿恢复正常活动的标准

- A.尿常规正常 B.血沉正常 C.血压正常 D.尿阿迪计数正常 E.抗链球菌溶血素O效价正常

7.患儿，8岁，4周前患扁桃体炎，近日眼睑水肿、尿少，有肉眼血尿，血压18/12kPa，应考虑的疾病是

- A.急性肾炎 B.慢性肾炎 C.单纯性肾病 D.肾炎性肾病 E.急进性肾炎

8.患儿8岁，因面部水肿、头痛、头晕就诊。尿液检查：蛋白(++)，红细胞20个/HP，诊断为急性肾小球肾炎。对其处理正确的是

- A.给镇痛药 B.适当下床活动，防止血栓形成 C.给大剂量青霉素
D.低盐、高糖、高蛋白饮食 E.低盐、高糖、高维生素饮食

9.患儿因急性肾小球肾炎入院，2天后尿少、水肿加重，伴呼吸困难，两肺有湿性啰音，心律奔马律，肝脏增大，可能并发了

A.支气管肺炎 B.急性肾衰竭 C.高血压脑病 D.严重循环充血 E.电解质紊乱

10.男孩8岁因水肿入院。尿蛋白(++), 血压16 / 11kPa, 头痛、头晕, 初诊为急性肾小球肾炎.下述哪项处理最重要

A.无盐饮食 B.低蛋白饮食 C.利尿、消肿、降压 D.记出入液量 E.肌注青霉素

11. 患儿男, 8岁, 以急性肾小球肾炎收入院。入院后, 患儿眼睑水肿, 尿为洗肉水样, 疲乏无力。此时对患儿的首要护理措施是

A.卧床休息 B.定期测体重 C.密切检测血压 D.肾区热敷保暖 E.严格限制蛋白质的摄入

12.急性肾小球肾炎患儿应用青霉素的目的是

A.利尿消肿 B.防止合并症 C.预防肾功能损害 D.消除体内残余感染灶 E.预防肾脏炎症进一步发展

13. 患儿8岁, 患上呼吸道感染2周后, 出现食欲减退、乏力、尿少、水肿。体温: 37.5℃, 血压增高。尿蛋白、红细胞(+), 补体C₃低.诊断为急性肾小球肾炎。其首选的护理诊断 / 问题是

A.体温升高 B.体液过多 C.营养不足 D.排尿异常 E.活动无耐力

14. 上题该患儿的护理措施哪项正确

A.严格卧床休息1—2周 B.给予易消化的普食 C.血尿消失后可加强锻炼
D.每日留取晨尿送培养 E.严格控制蛋白质摄入量

15.急性肾小球肾炎前驱感染史通常为

A.链球菌感染后3—4天 B.链球菌感染后1—3周 C.链球菌感染后1个月
D.链球菌感染后6个月 E.链球菌感染后1年

16.急性肾小球肾炎引起水肿的主要机理是

A.大量蛋白尿引起的低蛋白血症 B.急性高血压引起急性心力衰竭
C.急性醛固酮增多引起水、钠潴留 D.肾小球滤过率下降 E.全身毛细血管通透性增加

17.急性肾炎合并急性肾功能不全时的临床表现为

A.严重少尿或尿闭 B.氮质血症 C.高钾血症 D.代谢性酸中毒 E.以上均是

18.链球菌感染后急性肾小球肾炎辅助检查结果可见

- A.血浆总蛋白明显降低 B.蛋白定性+++—++++ C.尿内大量白细胞
D.血清补体降低 E.血胆固醇增高

19.急性肾小球肾炎的治疗，正确的是

- A.卧床休息 8 周以上 B.无盐饮食至尿蛋白消失 C.低蛋白饮食 3 周以上
D.血沉正常后，可恢复正常上学及活动 E.应用抗生素 7-10 天清除感染病灶的细菌

20.在静脉滴注硝普钠过程中，应随时监测

- A.呼吸 B.心率 C.血压 D.脉搏 E.体温

21.急性肾小球肾炎患儿低盐饮食必须持续至

- A.全部症状消失 B.水肿消退 C.尿蛋白消失 D.水肿消退，血压正常 E.镜下血尿消失

22.对急性肾小球肾炎患儿的护理，哪项不妥

- A.卧床休息至水肿消退 B.少尿时应控制盐和蛋白质的摄入 C.应鼓励饮水，以利毒素排出
D.应用抗生素清除残存链球菌 E.血沉正常才能上学

23.患儿，男，7岁.以急性肾小球肾炎收入院，突然出现头痛、眼花并伴呕吐。可能的原因

- A.出现脑膜炎 B.出现高血压脑病 C.出现脑血栓 D.出现严重循环充血 E.出现急性肾衰竭

24.急性肾小球肾炎患儿，女，10岁，入院治疗1周余，现水肿已消退，血压正常，但尿液化验仍有较多红细胞，此时对该患儿最重要的健康指导是

- A.介绍急性肾炎的发生原因 B.解释限制饮食的意义 C.解释限制活动的重要性
D.说明预防急性肾炎的要点 E.介绍预后估计

25. 患儿，男，10岁.因发热、颜面水肿就诊，自述头痛、头晕、乏力。体检：T 38℃，P 120次/分，R 28次/分，BP 130 / 100mmHg，面部及下肢水肿，呈非凹陷性，头部见有小脓疱3个。尿化验：红细胞(++), 有多种管型。该患儿所患疾病可能是

A.脓毒血症 B.微循环衰竭 C.高血压脑病 D.肾病综合征 E.急性肾小球肾炎

26. 上题首先的护理诊断是

A.活动无耐力 B.体温过高 C.体液过多 D.疼痛 E.皮肤完整性受损

27. 上述患儿最重要的护理观察内容是

A.神志变化 B.脉搏变化 C.呼吸变化 D.尿量变化 E.水肿变化

28. 患儿，男，6岁，2周前有上呼吸道感染，近日晨起出现眼睑水肿，浓茶色尿，以急性肾小球肾炎收入院，1日后测得该患儿血压120/80mmHg，诉头痛，24小时尿量400ml，尿蛋白(+)，此时应当注意预防

A.严重水肿 B.大量蛋白尿 C.低蛋白血症 D.高血压脑病 E.急性肾衰竭

29. 患儿，男，6岁，2周前有上呼吸道感染，近日晨起出现眼睑水肿，浓茶色尿。以急性肾小球肾炎收入院。患儿经治疗后好转，准备出院，家长询问何时可以上学，正确的说法是

A.血沉正常后 B.肉眼血尿消失后 C.Addis计数正常后 D.病后2—3周 E.病后2—3个月

30.小儿泌尿系统解剖特点不正确的是

A.肾脏位置偏低，2岁以内查体可触及 B.输尿管长而弯曲，易受压及扭曲

C.膀胱位置偏高，尿液充盈时可触及 D.女婴尿道较短，容易发生逆行性感染

E.男婴尿道较长，且常有包茎，不易发生逆行性感染

31.对婴幼儿肾功能描述不正确的是

A.肾小球滤过率低 B.肾血流量低 C.肾小管的重吸收能力差 D.尿比重低 E.肾小管的排泄功能正常

32.婴幼儿少尿的概念是昼夜尿量

A.<200ml B.<300ml C.<400ml D.<50ml E.<100ml

33.小儿泌尿系解剖特点正确的是

A.年龄越小，肾脏相对越重 B.输尿管狭窄，不易受压及扭曲 C.膀胱位置偏低，尿液充盈时可触及 D.女婴尿道较长，不易发生上行感染 E.男婴尿道较长，不易发生逆行感染

34.不符合小儿泌尿系统解剖特点的描述是

- A. 婴儿膀胱位置较高 B. 新生女婴尿道仅为 1cm C. 女婴容易发生上行感染
D. 年龄越小，肾脏位置越高 E. 婴儿输尿管容易受压扭曲
35. 小儿无尿概念是指每日尿量少于 A. 10ml B. 30ml C. 50 ml D. 70ml E. 100ml
36. 有关新鲜尿液离心后沉渣镜检和 Addis 计数检查，正常的是
- A. 红细胞 < 5 / HP B. 白细胞 < 10 / HP C. 常见透明管型
D. 12 小时 Addis 计数红细胞 < 100 万个
E. 12 小时 Addis 计数白细胞 < 100 万个，管型 < 5000 个