

第四章 医院感染的预防与控制

【开始】单选题（分值=4 分；答案=E）

1. 下列哪项不属于 WHO 提出的有效控制医院感染的措施

- A. 消毒和灭菌效果监测
- B. 无菌技术
- C. 隔离
- D. 清洁
- E. 微创技术的应用

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=D）

2. 下列不符合无菌技术操作原则的是

- A. 无菌包须有标记和无菌日期
- B. 无菌操作时手臂位于腰部水平以上
- C. 无菌物品与非无菌物品分别放置
- D. 无菌持物钳可夹取所有无菌物品
- E. 一份无菌物品供一位患者使用一次

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=D）

3. 煮沸消毒时为提高沸点, 可加入

- A. 氯化铵
- B. 亚硝酸钠
- C. 碳酸钠
- D. 碳酸氢钠
- E. 碳酸铵

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=A）

4. 用煮沸法消毒物品，正确的是

- A. 水沸后放入橡胶管
- B. 组织剪刀关闭轴节
- C. 水沸后放入玻璃物品
- D. 大小相同的治疗碗可重叠
- E. 煮沸中途加入物品应从加入开始即计时

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=C）

5. 紫外线灯管消毒，应从灯亮后几分钟开始计时

- A. 1-3 分钟
- B. 3-5 分钟
- C. 5-7 分钟
- D. 7-9 分钟
- E. 9-11 分钟

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=D）

6. 不属于物理消毒灭菌的方法是

- A. 燃烧法
- B. 臭氧灭菌灯消毒法
- C. 微波消毒灭菌法
- D. 浸泡法
- E. 生物净化法

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=E）

7. 使用化学消毒剂的注意事项中，下列哪一项是错误的

- A. 严格掌握药物的有效时间和浓度
- B. 浸泡前要打开器械的轴节
- C. 物品应全部浸没在消毒液中
- D. 消毒液容器要盖严
- E. 使用前用 3%盐水冲净，以免药液刺激组织

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=D）

8. 对肝炎患者用过的票证最好的消毒方法是

- A. 氯胺喷雾
- B. 紫外线照射
- C. 高压蒸汽灭菌
- D. 甲醛柜熏蒸
- E. 过氧乙酸浸泡

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=E）

9. 使用无菌持物钳, 下列哪项是不正确的

- A. 应浸泡在盛有消毒液的大口容器内
- B. 液面浸没轴节以上 2~3cm
- C. 每个容器只能放一把
- D. 取钳应将钳端闭合
- E. 可用于夹取消毒的油纱布

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=E）

10. 取用无菌溶液, 正确的是

- A. 取用前首先检查溶液是否澄清再检查溶液的名称
- B. 手指触及瓶盖内面
- C. 倒溶液时溶液瓶口触碰无菌容器
- D. 将无菌敷料直接伸入瓶内蘸溶液
- E. 溶液未用完注明开瓶日期和时间

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=E）

11. 不宜采用燃烧法灭菌的物品

- A. 换药碗
- B. 坐浴盆
- C. 污染的纸张
- D. 特殊感染伤口的辅料
- E. 手术刀

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=D）

12. 使用燃烧法消毒灭菌时, 不正确的操作是

- A. 锐利刀剪不能用燃烧法
- B. 燃烧时需远离易燃易爆物品
- C. 燃烧前容器应洗净擦干
- D. 在燃烧中可随时加入 95%的乙醇以提高灭菌效果
- E. 应使容器内面全部被火焰烧到

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=E）

13. 灭菌效果最可靠的物理灭菌法是

- A. 燃烧法
- B. 煮沸消毒法
- C. 紫外线照射法
- D. 日光曝晒法
- E. 压力蒸气灭菌法

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=A）

14. 下排气式压力蒸气灭菌法一般的压力及温度是

- A. 103kPa, 121℃
- B. 103kPa, 132℃
- C. 205kPa, 121℃
- D. 205kPa, 128℃
- E. 205kPa, 132℃

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=D）

15. 下列关于紫外线消毒空气的叙述，不正确的是

- A. 照射时间应不少于 30 分钟
- B. 消毒过程中用纱布遮盖病人双眼
- C. 灯管用乙醇棉球擦拭
- D. 使用超过 700 小时的灯管应更换
- E. 消毒过程中应避免人员走动并关闭门窗

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=C）

16. 不适宜空气消毒的化学消毒剂是

- A. 乳酸
- B. 食醋
- C. 甲醛
- D. 过氧乙酸
- E. 环氧乙烷

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=C）

17. 无菌操作中发现手套破裂时应

- A. 用无菌纱布将手套破裂处包好
- B. 用胶布将破裂处粘好
- C. 立即更换
- D. 再加套一幅手套
- E. 用乙醇棉球擦拭手套

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=D）

18. 已打开的无菌溶液，在未污染的情况下可保存的时间是

- A. 4 小时
- B. 8 小时
- C. 12 小时
- D. 24 小时
- E. 48 小时

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=C）

19. 在无菌容器内浸泡长度为 24cm 的持物镊，消毒液的适宜高度为

- A. 8cm
- B. 10cm
- C. 12cm
- D. 14cm
- E. 16cm

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=E）

20. 符合无菌操作原则的描述是

- A. 无菌操作前 20 分钟清扫地面
- B. 无菌包潮湿应待干后使用
- C. 取出的无菌物品如未使用应立即放回原处
- D. 治疗室每周用紫外线照射 1 次
- E. 操作时手臂保持在腰部水平以上

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=C）

21. 应执行保护性隔离的疫病是

- A. 痢疾
- B. 霍乱
- C. 白血病
- D. 伤寒
- E. 肺结核

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=A）

22. 接触传染病后刷洗双手，正确的顺序是

- A. 前臂、腕部、手掌、手背、手指、指缝、指甲
- B. 手指、指甲、指缝、手背、手掌、腕部、前臂
- C. 前臂、腕部、指甲、指缝、手背、手掌
- D. 手掌、腕部、手指、指甲、指缝、手背
- E. 腕部、前臂、手掌、手背、手指、指甲

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=B）

23. 苯扎溴铵（新洁尔灭）与肥皂同用，影响其消毒效果的原因是

- A. 降低浓度
- B. 拮抗失效
- C. 引起分解
- D. 引起污染
- E. 吸附作用

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=B）

24. 紫外线杀菌最强的波长范围是

- A. 210～230nm
- B. 250～270nm
- C. 310～330nm
- D. 350～370nm
- E. 410～450nm

【结束】

【开始】单选题（分值=4 分；答案=A）

25. 患者女性，23 岁。诊断为“甲型肝炎”收住入院。护士护理患者穿过的隔离衣，被视为清洁部位的是

- A. 衣领
- B. 袖口
- C. 腰部以上
- D. 腰部以下
- E. 胸部以上

【结束】