

1. 测量脉搏首选动脉是 (B)

- A. 颞动脉
- B. 桡动脉
- C. 颈动脉
- D. 肱动脉
- E. 足背动脉

2. 体温高低不一，日差 $>1^{\circ}\text{C}$ ，但最低温度仍在正常水平以上的热型。称为 (A)

- A. 弛张热
- B. 稽留热
- C. 间歇热
- D. 不规则热
- E. 波浪热

3. 肿瘤性发热常见热型为 (E)

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 超高热
- E. 不规则热

4. 在对高热患者的护理中，下列护理措施哪项不妥 (D)

- A. 卧床休息
- B. 测体温每 4 小时 1 次
- C. 鼓励多饮水
- D. 冰袋放患者头顶、足底处
- E. 每日口腔护理 2-3 次

5. 失血性休克患者的脉搏特征是 (E)

- A. 间歇脉

- B. 绀脉
- C. 奇脉
- D. 洪脉
- E. 丝脉

6. 节律改变的呼吸是 (A)

- A. 潮式呼吸
- B. 呼吸缓慢
- C. 蝉鸣样呼吸
- D. 深度呼吸
- E. 鼾声呼吸

7. 喉头有异物，呼吸可呈 (D)

- A. 库斯莫尔呼吸
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 鼾声呼吸
- D. 蝉鸣样呼吸
- E. 比奥呼吸

8. 测血压时袖带缠得过紧可使 (A)

- A. 血压偏低
- B. 脉压加大
- C. 收缩压偏高
- D. 舒张压偏高
- E. 舒张压偏低

9. 使血压测量值相对准确的措施不包括 (E)

- A. 被测者坐位时，肱动脉平第四肋软骨
- B. 缠袖带松紧以放入一指为宜
- C. 重测血压必须使汞柱降至“0”

- D. 偏瘫患者在健侧肢体测量
- E. 需密切观察血压的患者，应固定测量者

10. 成人生命体征数值在正常范围内的一组是 (C)

- A. T37°C，P102 次/分 R22 次/分 BP120/ 75mmHg
- B. T38°C，P98 次/分 R24 次/分 BP112/ 67mmHg
- C. T36°C，P88 次/分 R20 次/分 BP130/ 80mmHg
- D. T35°C，P58 次/分 R15 次/分 BP105/ 64mmHg
- E. T36°C，P70 次/分 R18 次/分 BP142/ 97mmHg

11. 关于血压的生理性变化, 错误叙述的是 (E)

- A. 小儿血压低于成年人
- B. 中年以前女性血压低于男性
- C. 清晨血压低于傍晚
- D. 上肢血压低于下肢
- E. 寒冷环境血压低于高温环境

12. 败血症病人发热时常见的热型是 (B)

- A. 间歇热
- B. 弛张热
- C. 不规则热
- D. 波浪热
- E. 回归热

13. 物理降温后，需要多长时间再次测体温以便进行观察 (D)

- A. 10 分钟
- B. 15 分钟
- C. 20 分钟
- D. 30 分钟
- E. 40 分钟

14. 对脉搏短绌的病人测心率、脉率正确的方法是 (C)

- A. 先测心率，后测脉率
- B. 先测脉率，后测心率
- C. 一人测心率，一人测脉率，测 1 分钟
- D. 一人测心率、脉率，另一人报告医师
- E. 一人发口令，另一人测心率、脉率

15. 对脉搏生理性变化错误的叙述是 (B)

- A. 幼儿比成人快
- B. 同龄男性比女性快
- C. 老年人比较慢
- D. 情绪激动时快
- E. 休息睡眠时减慢

16. 单位时间内脉率少于心率多见于 (D)

- A. 颅内压增高
- B. 高热
- C. 洋地黄中毒
- D. 心房纤颤
- E. 心肌炎

17. 代谢性酸中毒病人的呼吸表现为 (A)

- A. 深大而规则的呼吸
- B. 浮浅性呼吸
- C. 蝉鸣样呼吸
- D. 呼吸和呼吸暂停交替出现
- E. 吸气和呼气均感费力

18. 测量呼吸时护士的手仍置于病人脉搏部位是为了 (D)

- A. 表示对病人的关心
- B. 为了看表计时
- C. 测脉搏估计呼吸频率
- D. 转移病人的注意力
- E. 将脉搏与呼吸频率对照

19. 当危重病人呼吸微弱，不易观察时测量呼吸频率的方法是 (E)

- A. 仔细听呼吸音响并计数
- B. 手置病人鼻孔前，以感觉气流通过并计数
- C. 手按胸腹部，根据胸腹部起伏次数计算呼吸频率
- D. 测得的脉搏乘以 1/4，以推测呼吸次数
- E. 置少许棉花于病人鼻孔前计数其被吹动的次数

20. 呼吸和呼吸暂停交替出现称为 (B)

- A. 陈—施呼吸
- B. 毕奥呼吸
- C. 库斯毛呼吸
- D. 浮浅呼吸
- E. 鼾声呼吸

21. 脉压增大主要见于 (D)

- A. 心包积液
- B. 心肌梗死
- C. 心动过速
- D. 动脉硬化
- E. 休克

22. 以口腔温度为标准，体温过低的范围是 (A)

- A. 35℃以下
- B. 35~36℃

C. 36.6~37.5℃

D. 37.3~38℃

E. 38.1~38.5℃

23. 病人退热期体温下降时因大量出汗易出现 (B)

A. 低温

B. 虚脱

C. 皮肤潮红

D. 呼吸加快

E. 畏寒

24. 适宜在口腔测量体温的病人是 (E)

A. 昏迷者

B. 患儿

C. 口鼻手术病人

D. 呼吸困难者

E. 肛门手术病人

25. 丁先生, 入院 7 天, 体温均在 39.5-40℃。其热型是 (D)

A. 间歇热

B. 弛张热

C. 波浪热

D. 稽留热

E. 不规则热