

## 第九章 护患关系与护患心理

患者张某，女，55岁，车祸致伤，昏迷。此时应采取的护患关系模式（B）

- A.主动-主动型
- B.主动-被动型
- C.被动-被动型
- D.指导-合作型
- E.共同参与型

患者徐某，男，45岁，由于车祸急诊入院，手术抢救后病情基本稳定，意识清晰。此时应采取的护患关系模式是（D）

- A.主动-主动型
- B.主动-被动型
- C.被动-被动型
- D.指导-合作型
- E.共同参与型

患者王某，女，60岁，大学教授，患风湿性心脏病15年。该患者对自身所患疾病有比较充分的了解，知道诊断、治疗和护理的意义。此时应采取的护患关系模式是（E）

- A.主动主动型
- B.主动被动型
- C.被动-被动型
- D.指导-合作型
- E.共同参与型

女性，岁，因肠梗阻入院治疗，责任护士来到其床边询问病史，此时他们的关系是（C）

- A.准备期
- B.初始期
- C.工作期
- D.结束期
- E.延续期

男性，45岁，2型糖尿病，多饮多食多尿消瘦。护士通过收集资料了解到该患者存在知识缺乏，并为其制定护理计划，此时护士与患者的护患关系发展时期是（C）

- A.熟悉期
- B.开始期
- C.工作期
- D.解决期
- E.结束期

护患关系建立初期，护患关系发展的主要任务是（D）

- A.对患者收集资料
- B.确定患者的健康问题
- C.为患者制定护理计划
- D.与患者建立信任关系
- E.为患者解决健康问题

护患关系开始建立的时间是：（C）

- A.患者入院24小时内
- B.护患双方自我介绍时

- C.护士与患者第一次见面时
- D.在双方知道彼此的姓名之后
- E.正式评估患者，收集资料时

护士为一位即将出院的术后患者进行出院前的健康指导，此时护患关系处于（D）

- A.准备期
- B.初始期
- C.工作期
- D.结束期
- E.熟悉期

女性，45岁，小学文化，刚刚知晓自己被诊断为原发性支气管肺癌。询问护士：“我是不是活不了多久了？”针对该患者的心理护理，错误的是（D）

- A.耐心倾听患者的诉说
- B.讲解有关疾病知识及治疗措施
- C.安排家庭成员和朋友定期看望患者
- D.指导患者立遗嘱，安排后事
- E.安慰患者，保持积极情绪

女患儿，2个月，因肺炎、高烧急诊入院。护士在为其静脉输液时，两次穿刺失败，患儿父亲非常气愤，甚至谩骂护士。导致此事件发生的主要因素是（B）

- A.角色责任模糊
- B.角色期望冲突
- C.角色心理差位
- D.角色权利争议
- E.经济压力过重