

不符合取药操作要求的是(D)

- A. 取固体药用药匙
- B. 取水剂药液前将药液摇匀
- C. 药液量不足 1ml，用滴管吸取
- D. 油剂药液滴入杯内后加入适量冷开水
- E. 患者个人专用药不可互相借用

发口服药不符合要求的是(C)

- A. 根据医嘱给药
- B. 做好心理护理
- C. 鼻饲患者暂缓发药
- D. 患者提出疑问须重新核对
- E. 危重患者要喂服

下列哪类药物服用后必须多饮水(E)

- A. 铁剂
- B. 止咳糖浆
- C. 助消化药
- D. 健胃药
- E. 磺胺类药

指导患者服药, 错误的方法是(D)

- A. 服铁剂忌饮茶
- B. 服酸类药物需用吸水管吸人
- C. 服止咳糖浆后不宜饮水
- D. 助消化药饭前服
- E. 对胃有刺激的药物饭后服

患者男, 糖尿病, 医嘱皮下注射普通胰岛素 8U, ac30 分, ac 的执行时间是(D)

- A. 早上 8:00

- B. 晚上 8:00
- C. 临睡前
- D. 饭前
- E. 必要时

氧气雾化吸入时,下述步骤哪项不妥(D)

- A. 患者吸入前漱口
- B. 药物用蒸馏水稀释在 5ml 以内
- C. 湿化瓶内不能放水
- D. 嘱患者吸气时松开出气口
- E. 氧流量用 6~10L/min

实施无痛肌内注射的措施,下列哪项不妥(A)

- A. 患者侧卧位时上腿弯曲
- B. 患者俯卧位时足尖相对,足跟分开
- C. 推注药液速度缓慢
- D. 同时注射两种药液时,应后注射刺激性强的药液
- E. 不在有硬结的部位进针

用皮内注射法接种卡介苗,正确的步骤是(C)

- A. 注射前询问过敏史
- B. 进针部位在前臂掌侧上段
- C. 进针时针头与皮肤呈 5° 角
- D. 注入药物前要抽回血
- E. 拔针后用干棉签轻压针刺处

肌内注射时,下列措施哪项不妥(B)

- A. 注射前做好解释
- B. 取髂前上棘和尾骨连线的外上 1/4 处为注射部位
- C. 推药液宜慢

- D. 注射油剂针头宜粗长
- E. 刺激性强的药液后注射

静脉注射不正确的步骤是(D)

- A. 在穿刺点上方约 6cm 处扎止血带
- B. 常规消毒皮肤后嘱患者握拳
- C. 针头与皮肤呈 20° 角进针
- D. 见回血后即推注药液
- E. 注射后用干棉签按压拔针

下列有关超声雾化吸入的目的，不正确的叙述是(E)

- A. 预防感染
- B. 解除痉挛
- C. 消除炎症
- D. 稀释痰液
- E. 缓解缺氧

剧毒药及麻醉药最主要的保管原则是(B)

- A. 药名用中外、文对照
- B. 应加锁并严格交班
- C. 装密封瓶中保存
- D. 放于阴凉干燥处
- E. 与内服药分别放置

应远离明火处保存的物品是(C)

- A. 抗毒血清
- B. 胎盘球蛋白
- C. 乙醚、乙醇
- D. 肾上腺素
- E. 棕色合剂

下述服药方法，哪项不妥(A)

- A. 助消化药饭前服
- B. 健胃药饭前服
- C. 发汗药服后多饮水
- D. 服铁剂时应避免与牙齿接触
- E. 鼻饲病人应将药片研碎溶解后自胃管注入

服用洋地黄类药物时，护士应重点观察(C)

- A. 胃肠道反应
- B. 是否成瘾
- C. 心率
- D. 体温
- E. 有无皮疹

服磺胺类药多饮水的目的是(D)

- A. 避免损坏神经系统
- B. 减轻服药引起的恶心
- C. 增加药物疗效
- D. 避免尿中结晶析出
- E. 避免影响血液酸碱度

每晚一次的外文缩写是(C)

- A. Qh
- B. Hs
- C. Qn
- D. Dc
- E. Qod

超声波雾化吸入的特点是(A)

- A. 雾滴小而均匀，可吸入支气管末端
- B. 病人不需漱口，便可操作
- C. 温度高于体温，节约资源
- D. 雾量大小固定
- E. 用氧量小节约资源

超声波雾化吸入时，水槽内水温不可超过(C)

- A. 30 度
- B. 40 度
- C. 50 度
- D. 60 度
- E. 70 度

氧气雾化吸入时，氧流量应调至多少 L/min(C)

- A. 2-4
- B. 4-6
- C. 6-10
- D. 12-14
- E. 14-16

皮内注射选前臂掌侧下段的原因是(A)

- A. 皮肤薄、颜色浅
- B. 没有大血管
- C. 离大神经较远
- D. 皮下脂肪薄
- E. 操作较方便

2岁以下的婴儿肌肉注射时，最好选用(C)

- A. 臀大肌
- B. 上臂三角肌

- C. 臀中肌、臀小肌
- D. 股外侧肌
- E. 前臂外侧肌

接种乙型脑炎疫苗的部位是(B)

- A. 前臂掌侧下段
- B. 三角肌下缘
- C. 前臂外侧
- D. 上臂三角肌
- E. 股外侧肌

为病人进行注射时，首先要检查药液(A)

- A. 标签是否符合
- B. 有无混浊
- C. 有无沉淀
- D. 有效期
- E. 有无配伍禁忌

对长期进行肌肉注射的病人，护士在注射前应特别注意(A)

- A. 评估病人局部组织状态
- B. 针体不可全部刺入
- C. 询问病人有无过敏史
- D. 认真消毒病人皮肤
- E. 病人体位的舒适

皮内注射过程中，下列哪项是错误的(D)

- A. 严格三查七对
- B. 用 70%乙醇消毒皮肤
- C. 注射量 0.1ml
- D. 拔针后，用无菌棉签按压进针处

E. 针尖与皮肤呈 5° 角刺入

不属于“三查七对”内容的是(E)

A. 床号、姓名

B. 药名、浓度、剂量

C. 方法、时间

D. 操作前、操作中查

E. 检查用药后反应

下列外文缩写的中文译意不正确的是(B)

A. qod——隔日 1 次

B. hs——每晚 1 次

C. qd——每日 1 次

D. qid——每日 4 次

E. biw——每周 2 次

应放在 4°C 冰箱内保存的药物是(E)

A. 青霉素

B. 氨茶碱

C. 强的松

D. 苯巴比妥钠

E. 胎盘球蛋白

发药时，若病人提出疑问应采取的措施是(E)

A. 报告医师

B. 报告护士长

C. 考虑不用

D. 先发给病人再说

E. 重新核对，确认无误后给药

服用强心苷类药物的病人，若每分钟心率少于多少则应停药(C)

- A. 40 次/分
- B. 50 次/分
- C. 60 次/分
- D. 70 次/分
- E. 80 次/分

对牙齿有腐蚀作用的药物宜(D)

- A. 饭前服用
- B. 饭后服用
- C. 多饮水
- D. 用吸管吸
- E. 服后不宜立即饮水

可将高频电能转化为超声波声能的装置是(D)

- A. 超声波发生器
- B. 雾化罐过滤器
- C. 雾化罐透声膜
- D. 晶体换能器
- E. 胶体换能器

下列不属于超声波雾化器工作特点的是(E)

- A. 雾滴小而均匀，直径 5 μ m 以下
- B. 药液随呼吸可到达终末支气管及肺泡
- C. 雾化液温暖、舒适
- D. 雾量的大小可以调节
- E. 用氧量小，节约资源

患儿，男，3岁，因病毒性心肌炎入院，医嘱股静脉采血标本培养，穿刺部位在(A)

- A. 股动脉内侧 0.5cm 处
- B. 股动脉外侧 0.5 cm 处
- C. 股神经内侧 0.5cm 处
- D. 股神经外侧 0.5cm 处
- E. 股神经和股动脉之间

可以用手接触注射器及针头的(D)

- A. 针尖
- B. 针梗
- C. 乳头
- D. 针栓
- E. 活塞

注射时防止感染的主要措施与下列有关的是(C)

- A. 选择无钩、无弯曲的锐利针头
- B. 注意药物配伍禁忌
- C. 注射部位皮肤消毒直径 5cm 以上
- D. 不可在硬结、瘢痕处进针
- E. 不可使用变色、混浊的药液

同时注射几种药物时，下列描述不正确的是(D)

- A. 注射速度应慢
- B. 解除思想顾虑
- C. 减轻疼痛
- D. 刺激性强药物先注射
- E. 分散注意力

同时注射数种药物时，应特别注意药物的(D)

- A. 刺激性
- B. 有无变质

- C. 有效期
- D. 配伍禁忌
- E. 药物剂量

静脉注射时，止血带应扎在穿刺点上方(B)

- A. 4cm
- B. 6cm
- C. 8cm
- D. 10cm
- E. 2cm